

# Admiral<sup>®</sup>

(Αντιμυράλ)

**Επενδύστε στην Ποιότητα!**



## **Βαμβακάδα Ψώρα San Jose**

**Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά,  
Βερικοκιά, Δαμασκηνιά**



## **Ψώρα San Jose** Μηλιά, Αχλαδιά



Για αγορές πάνω από 1,5 Λίτρο  
**ΔΩΡΟ ΣΚΟΥΦΟΣ**

Το **Admiral®** αποτελεί την νέα προσέγγιση καταπολέμησης των κοκκοειδών της οικογένειας των Diaspididae (*Quadraspidiotus perniciosus* ή *San Jose*), και της Άσπρης ψώρας ή Βαμβακάδας (*Pseudaulacaspis pentagona*) στα οπωροφόρα.


Τα κοκκοειδή αυτά αποτελούν σημαντικό εχθρό για την δενδροκομία στην χώρα μας. Προκαλούν εξάντληση των δένδρων, βαθμιαία ξήρανση των προσβεβλημένων κλάδων καθώς και σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας των καρπών.

### ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **Admiral®** είναι ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων και εμποδίζει τις διαχειμάζουσες νύμφες του εντόμου να περάσουν στο στάδιο των ακμαίων. Το στάδιο που προτείνονται οι ψεκασμοί είναι πριν την άνθηση για μηλιά, αχλαδιά, βερικοκιά, κερασιά και πριν ή μετά την άνθηση για ροδακινιά, δαμασκινιά και νεκταρινιά, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	ΜΗΛΟΕΙΔΗ
	Ροδακινιά - Δαμασκινιά - Νεκταρινιά:	Βερικοκιά - Κερασιά και άλλα είδη πυρηνοκάρπων:	Μηλιά - Αχλαδιά
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.	Ψεκασμός πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.	
ΡΗΙ (Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή):	14 ημέρες.	Δεν βρίσκει εφαρμογή, αφού εφαρμόζεται πριν την άνθηση.	
ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΗ	30 κ.εκ./100 λίτρα με 80-100 λίτρα διαλύματος ανά στρέμμα.		
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	Μία		

Αποτελεσματικότητα του Admiral εναντίον της ψώρας του San Jose σε μηλιά



143 ημέρες μετά τον ψεκασμό. Εφαρμογή προανθικά

Ψώρα San Jose

Βαμβακάδα (*Pseudaulacaspis pentagona*)

Ψώρα San Jose σε νεκταρινία

