



Νηματοδωκτόνο



(Νεμαθορίν)

Nemathorin® 150 EC

Στήριξε την παραγωγή σου σε υγιείς ρίζες!





Nemathorin® 150 EC



Το **Nemathorin 150 EC** με δραστική ουσία το fosthiazate αποτελεί την πρόταση της Χελλαφάρμ στη διαχείριση των νηματωδών στην καλλιέργεια του ακτινίδιου.

Τρόπος δράσης

Το **Nemathorin 150 EC** είναι οργανοφωσφορικό νηματοδοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση κομβονηματωδών του γένους *Meloidogyne* spp.. Αρχικά δρα ως νηματοδοστατικό προκαλώντας παράλυση των νηματωδών και στη συνέχεια ως νηματοδοκτόνο. Οι θάνατοι των νηματωδών παρατηρούνται από την 3η ημέρα της εφαρμογής και μετά. Και με τους δύο τρόπους δράσης το προϊόν εμποδίζει την προσβολή των ριζών ή εφόσον έχει ήδη συμβεί η προσβολή, την περαιτέρω ανάπτυξη της.

Πλεονεκτήματα του Nemathorin 150 EC

- ✓ **Πολύ καλή αποτελεσματικότητα** στους κομβονηματωδείς.
- ✓ **Προστασία του ριζικού συστήματος από νωρίς** (λόγω του χρόνου εφαρμογής).
- ✓ **Εύκολη εφαρμογή** μέσω της στάγδην άρδευσης.

Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής

Στο Ακτινίδιο (χρήση ήσσονος σημασίας) προτείνεται να εφαρμόζεται την Άνοιξη πριν το άνοιγμα του 1ου άνθους σε γυμνό έδαφος μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης. Η εφαρμογή πρέπει να γίνει σε ομοιόμορφο και καλά κατεργασμένο και ποτισμένο έδαφος ενώ πρέπει να ακολουθηθεί πότισμα με αρκετό νερό ώστε να ενσωματωθεί το προϊόν στο έδαφος σε βάθος 10 - 15 εκατοστά.

Προτεινόμενη Δόση

0,5 - 1 λίτρο Nemathorin 150 EC ανά στρέμμα.

Η μικρότερη δόση να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που σε όλη την έκταση του αγρού ο πληθυσμός των νηματωδών είναι χαμηλός.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Μη εφαρμόσιμο (εφαρμογή την άνοιξη πριν το άνοιγμα του πρώτου άνθους).