

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πυρηνόκαρπα και οποιαδήποτε καλλιέργεια προσβάλλεται από τους βλαστορύκτες Grapholita molesta και Grapholita funebrana: Καταπολέμηση του βλαστορύκτη της ροδακνιάς (Grapholita molesta) και της δαμασκηνιάς (Grapholita funebrana) χρησιμοποιώντας 2-3 συσκευές για 10 στρέμματα. Εφαρμογή πριν την έναρξη της πτήσης της 1ης γενιάς. Μεγ. οριθ. εφαρμ. ανά καλ. περιόδο: Μην εφαρμόζετε περισσότερο από 144 g δ.ο./εκτάριο/έτος.

Παρατηρήσεις: 1. Το προϊόν δρά μόνο κατά των ακμαίων της Grapholita molesta & G. funebrana και δεν επηρέαζει άλλο είδος. 2. Μία εφαρμογή αρκεί για να καλύψει όλη την καλλιέργητη περίοδο, ανεξάρτητα από τις μετεωρολογικές συνθήκες. 3. Η κατάλληλη δόση επιλέγεται με βάση την εμπειρία στο χωράφι (διαστάσεις χώρου, πίεση πληθυσμού, γειτονικές καλλιέργειες). 4. Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης και συμβουλευτείτε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εξασφαλίστε ακριβή εικόνα της κατάστασης του οπωρώνα με καταμέτρηση των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και ελέγχους των φύλων και των καρπών για προσβολές από Grapholita καθ' όλη τη διάρκεια προστασίας της καλλιέργειας. 5. Ανάλογα με το σχήμα και τις διαστάσεις του οπωρώνα, την κατεύθυνση των επικρατέστερων ανέμων και τις γειτονικές καλλιέργειες οι οποίες μπορεί να γίνουν εστίες μετακίνησης ήδη γονιμοποιημένων θηλυκών Grapholita, υπολογίστε εκ των προτέρων τις αποστάσεις μεταξύ των διαχυτήρων ώστε η κατανομή τους να είναι ομοιόμορφη. Σε οπωρώνες με μεγάλη περίμετρο, η τοποθέτηση των διαχυτήρων πρέπει να διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη και το ανάγλυφο του οπωρώνα. Αν χρειαστεί ζητήστε τεχνική συμβουλή για τη ωστή κατανομή των διαχυτήρων. Σε γενικές γραμμές προτείνεται ομοιόμορφη κατανομή με πρόσθετη προστασία στις άκρες του αγρού που βρίσκονται στην κατεύθυνση των επικρατέστερων ανέμων. 6. Σε περίπτωση που το προϊόν χρησιμοποιηθεί μετά την έναρξη της πτήσης, συνιστάται κατά την ανάρτηση των Checkmate Puffer OFM να γίνεται και φεκασμός με εντονωτικό κατάλληλο για τη καταπολέμηση των αυγών και προνυμφών του βλαστορύκτη που ήδη υπάρχουν στον οπωρώνα. 7. Σε αγρούς με ιστορικό υψηλής πίεσης πληθυσμού ή σε περίπτωση εμφάνισης μη αποδεκτών προσβολών πραγματοποιείστε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα εντομοκτόνα ή άλλες μεθόδους καταλληλότητας. 8. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία.

Τρόπος εφαρμογής: Τοποθετήστε το δοχείο του προϊόντος στην συσκευή αυτόματης διάχυσης. Αναρτήστε τη συσκευή σε κλαδί ή πάσασαλ στο αντέρο 1/3 της κομής του δεντρού ή ψηλότερα. Αποφύγετε τη διάχυση του προϊόντος απευθείας στη βλαστική ζώνη ώστε να μεγιστοποιήσετε τη διασπορά της φερομόνης. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Δεν εφαρμόζεται. **Οδηγίες για την ασφαλή υπόσυρση του φυτορροστατικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πλήρως άδειο δοχείο δεν πρέπει να διατίθεται στο περιβάλλον και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Μην το καταστρέψετε ή το θάψετε ακόμη και μετά τη χρήση. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος:** Όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε δηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 3 χρόνια. Διατηρήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης, θερμότητας και ηλιακό φως. Προστατεύστε το προϊόν από έκθεση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50°C.

CheckMate® Puffer OFM

(Z)-8-dodecen-1-yl acetate,
(E)-8-dodecen-1-yl acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol

ΑΕ (αερόλυμα, αεραζόλ)

Εγγυημένη Σύνθεση (β/β):

(Z)-8-dodecen-1-yl acetate: 11.63 % β/β
(E)-8-dodecen-1-yl acetate: 0.75 % β/β &
(Z)-8-dodecen-1-ol: 0.12 % β/β
Βοηθητικές συστίσεις: μέχρι 100% β/β

ΑΔΔΑ: 9077/20-12-2016

Φερομόνη φύλου για καταπολέμηση του βλαστορύκτη της ροδακνιάς (*Grapholita molesta*) και της δαμασκηνιάς (*Grapholita funebrana*) σε πυρηνόκαρπα, και οποιαδήποτε καλλιέργεια προσβάλλεται από τους συγκεκριμένους βλαστορύκτες

Καθαρό βάρος: 384 γραμμαρία

Suterra®

Κάτοχος της οίδεας:

Suterra Europe Biocontrol S.L.

Plaza America 2, Planta 9 46004 - València ΙΣΠΑΝΙΑ

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



Αθήνα: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23, Τηλ.: 2106800900
www.hellafarm.gr - email: info@hellafarm.gr

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Εύφλεκτο αερόλυμα Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / γυμνές φλόγες/ θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. Περιέκτηση υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Πλυνθείτε σχολαστικά με άθροινο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα απομκής προστασίας για τα μάτια. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα γάντια κατά το χειρισμό του προϊόντος και εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κλειστό περιβάλλον. “**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθεύστε τις οδηγίες χρήσης.**”

Πρώτες βοηθείες -Αντίδοτο: Σε περίπτωση εποφής με τα μάτια: Πλυνθείτε αμέσως με άθροινο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εποφής με το δέρμα:** Πλυνθείτε αμέσως με άθροινο νερό και σαπούνι. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός που επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. **Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων:** 2107793777

Το προϊόν περιέχει 154 γρ. (μέγιστο) φθοριούχο αερίου θερμοκρασίας HCF-134a, ισοδύναμο με 220 kg Co₂

Αρ. Παρτίδας - Ημ. Παραγωγής: βλέπε επί της συσκευασίας