


**Κίνδυνος**

Προκαλεί σοβαρή οιθαλμική βλάβη  
Τοξικό για τους υδρόβιους  
οργανισμούς, με μακροχρόνιες  
επιπτώσεις



**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτηρόφες. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Διάθεστο το περιεχόμενο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Να αποφύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ** Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα και κρατήστε τον σε αναπαυτική θέση και ζεστό. Για δύσκολες περιπτώσεις, ζητήστε ιατρική βοήθεια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα με νερό, χορηγείστε μεγάλη ποσότητα νερού, και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

**Αποθήκευση:** Σε δροσερό και ξηρό χώρο. Διατηρήστε το μακριά από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

**Προσοχή:** Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του προϊόντος από τους Γεωπόνους της Εταιρείας και το ειδικό φυλλάδιο που διαθέτουμε.

**Σημείωση:** Η Εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. εγγυάται την ελεγμένη σύνθεση του προϊόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα της χρήσης αυτού, άσχετα αν αυτή έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως ή όχι ή για τυχόν ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, που οφείλονται στην αποθήκευσή ή χρησιμοποίηση του προϊόντος. Κάθε αγορά θεωρείται ότι είναι σύμφωνη με τους ανωτέρω όρους.


Το 1% του μίγματος αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας και περιβαλλοντικής τοξικότητας.

Αρ. παρτίδας/Ημ. παραγωγής: βλέπε επί της φιάλης

**ALBION®  
PLANT NUTRITION**

# ΜΕΤΑΛΟΖΕΪΤ

**Minerals • Science • Chelates™**



## ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ



Εγγυημένη Σύνθεση: Ψευδάργυρος 6,8%

Χηλική μορφή με αμινοξέα

Λίπασμα νέου τύπου - ομάδα στη

Ποσοστό υδρολυμένης φυτικής πρωτεΐνης /συνολική: 100%

Αρ. Άδειας κυκλοφορίας: 53

**Χηλικές ενώσεις αμινοξέων με μέταλλα  
Υγρό διαφυλλικό λίπασμα ψευδαργύρου**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Προϊόν Η.Π.Α. Της: ALBION



Αποκλειστική διανομή -  
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900  
www.hellafarm.gr - e-mail: info@hellafarm.gr

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

Ο χρηλικός **ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΜΕΤΑΛΟΖΕΪΤ** προορίζεται για πρόληψη και θεραπεία ανωμαλιών στη θρέψη των φυτών, που προέρχονται από έλλειψη ή ανισορροπία διαφόρων ιχνοστοιχείων και που εμφανίζονται με μορφή τροφοπειών, μείωση παραγωγής και ποιότητας κ.λπ.

Χρησιμοποιείται με ψεκασμό επί του φυλλώματος των φυτών. Είναι προϊόν υδατοδιαλυτό και μη τοξικό για τα φυτά και τους καρπούς όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Χρησιμοποιείται σε Σιτρά, Φασόλια, Αραβόσιτο, Βαμβάκι, Φιστίκια, Πατάτες, Ρύζι, Ζαχαρόπετυλα, Τομάτες, Καπνό, Μηδική, Κηπευτικά, Εσπεριδοειδή, Οπωροφόρα δένδρα και άλλες καλλιεργείες (βλέπε οδηγίες χρήσης)

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Η δοσολογία καθορίζεται από το ειδος της καλλιεργείας, το στάδιο ανάπτυξης και τη σοβαρότητα της τροφοπειάς. Οι μέγιστες δόσεις συνιστώνται για φυτά πλήρους ανάπτυξης. Για εφαρμογή σε μικρότερα φυτά πρέπει να μειωθεί ανάλογα η δοσολογία.

-Φυτά μεγάλης καλ/γειας, λαχανικά, κηπευτικά, πατάτα. Δόση 120-240 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή κατά την περίοδο ταχείς ανάπτυξης ή έντονων θρεπτικών αναγκών. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί δύο ή περισσότερες φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

-Καρποφόρα δένδρα: Δόση 120-360 κ.εκ./στρ. Έναρξη των εφαρμογών στην αρχή της ανάπτυξης. Οι εφαρμογές μπορούν να επαναλαμβάνονται καθ' όλη την καλ/κή περίοδο με μεσοδιάστημα 2-4 εβδομάδων.

-Αμπέλια και μικροί καρποί (μούρα): Δόση 120-240 κ.εκ/στρ. Έναρξη των εφαρμογών στην αρχή της ανάπτυξης. Οι εφαρμογές μπορεί να επαναληφθούν καθ' όλη την περίοδο αύξησης με μεσοδιάστημα 1 ή περισσότερων εβδομάδων.

**Παρατηρήσεις:**

Στα πυρηνόκαρπα να εφαρμόζεται μόνο κατά το διάστημα από την καρποδέση ωστόσο η διάμετρος του καρπού φθάσει τα 2,5εκ.

Διαλύστε ένα μέρος του προϊόντος σε 20 ή περισσότερα μέρη νερού. Να μην εφαρμόζεται αδιάλυτο.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλη φεκαστική συσκευή και όγκο ώστε να επιτευχθεί πλήρης κάλυψη των φυτών.

Σε φυτά στα οποία είναι δύσκολη η διαβροχή του φυλλώματος (π.χ. κηρώδη φύλλα) συνιστάται η χρήση μη ιονικού διαβρεκτικού παράγοντα.

**Συνδυαστικότητα:** Να αποφεύγεται η ανάμιξη με σκευάσματα που περιέχουν χαλκό ή κασσίτερο επειδή μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα. Συνδυάζεται με λιπάσματα και φυτοφάρμακα ωστόσο πριν την ανάμιξη του προτείνεται μικρή συνδυαστικότητας.

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ**