

Roundup® MAX™

Roundup® MAX™

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιτ-φρουτ, Κιτριά), **Ακρόδρυα** (Αμυγδαλιά), **Μηλοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά), **Πυρηνόκαρπα** (Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Ροδάκινιά, Κερασιά), **Αμπέλια** (Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα), **Ελιές**, **α) Επίτσια ζιζάνια(*)** (αγρωστώδη, πλαταύψιλλα): 80-105 γρ./στρ. Δύο (2) το πολύ εφαρμογές στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης των ζιζανίων.

β) Πολυετή ζιζάνια()** (αγρωστώδη, πλαταύψιλλα): 260-530 γρ./στρ. (ανάλογα με το είδος του ζιζανίου). Μια(1) εφαρμογή κοντά κατά λίγο μετά από την άνθηση των ζιζανίων.

Αγριάδα (*Cynodon dactylon*): 400-530 γρ./στρ. (ανάλογα με το είδος του ζιζανίου).

Βέλιουρας (*Sorghum halepense*): 260 γρ./στρ.

Φέρτρη (*Pteridium aquilinum*): 260 γρ./στρ.

Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*): 530 γρ./στρ.

Κρίσιο (*Cirsium arvense*): 530 γρ./στρ.

Κυττέρη (*Cyperus sp.*): Δύο (2) εφαρμογές: α) 320 γρ./στρ. κατά την άνθηση και β) 260 γρ./στρ σε περίπτωση αναβλάστησης.

Άγροι μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά:

α) Επίτσια(*) και β) Πολυετή ζιζάνια(**): Με τις α.α. οδηγίες. Μια (1) εφαρμογή για κάθε ομάδα ζιζανίων.

Βαμβάκι(*)**: Κατευθύνομενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμάων πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας με 80-105 γρ./στρ για τα επίτσια ζιζάνια (1 εφαρμογή) και με 260 γρ./στρ για τα πολυετή ζιζάνια (βελιούρα) (1 εφαρμογή).

Καπνός: Για την καταπολέμηση της οροβάγχης εφαρμόζεται με δύο(2) ψεκασμούς καλύψεως: α) με 20 γρ./στρ. 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση και β) με 30 γρ./στρ. 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

Ακαλλιέργητες εκτάσεις:

α) Επίτσια ζιζάνια(*): Δύο (2) το πολύ εφαρμογές.

β) Πολυετή ζιζάνια(**): Με τις α.α. οδηγίες. Μια (1) εφαρμογή.

γ) Ξυλώδες θάμνοι, βάτα (*Rubus* κ.λ.π.): 260-530 γρ./στρ. Μία(1) εφαρμογή στην πλήρη ανάπτυξη.

Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών:

Υδροχοαρθρή ζιζανία: 420-530 γρ./στρ. Μία (1) εφαρμογή κοντά την άνθηση των ζιζανίων.

Ογκος ψεκαστικού υγρού: Σε όλες τις χρήσεις (πλήν καπνού) εφαρμόζεται με 20-40 λίτρα νερό/στρ. Μόνο στον καπνό, για την καταπολέμηση της οροβάγχης, εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό/στρ.

Χρονικός ψεκαστικού υγρού: Σε όλες τις χρήσεις (πλήν καπνού) εφαρμόζεται με 20-40 λίτρα νερό/στρ. Μόνο στον καπνό, για την καταπολέμηση της οροβάγχης, εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό/στρ.

(*) Για την καταπολέμηση των επίτσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/και καλοκαΐρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξη.

(**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά λίγο μετά από αυτή.

(***) Στα βαμβάκια ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθύνομενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαρχή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Προτείνεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθύνομενος αποφεύγοντας επαρχή των σταγονίδιων του διαλύματος με φύλλωμα, τριφερούς βλαστούς, παραφύλαδες και μη εποιλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους στον ωρίμοντα από το τρίτο (3) έτος από τη φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.

2. Για τα πλαταύψιλλα ζιζάνια *Malva spp.* (μολύβδια), *Urtica spp.* (τσουκνίδες), *Polygonum spp.* (πολικόμπι, λαπάτσα), *Portulaca oleracea* (αντάραλα), η δόση κυμαίνεται από 210-320 γρ./στρ., ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.

3. Για την αγριάδα η εφαρμογή για γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκ.

4. Για την φτέρη η εφαρμογή για γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.

5. Να μη γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.

6. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή.

7. Μην ψεκάζετε σταν φυσάει.

8. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους.

9. Για τις επιτραπέζιες ειδικές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δέντρο.

10. Η εφαρμογή για γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια

ΥΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θωρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος, Τηλ.: 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr

Roundup® MAX™

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Τρόπος δράσης: Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση επίτσιων και πολυετών (αγρωστώδων, πλαταύψιλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρέμποδίζει το ένζυμο EPSPS βλαστούς των ζιζανίων και παρέμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φύλλωμας των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαρχή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιέργειων προς αποφυγή τυχόν συστρώσεων υπολεμάτων στους καρπούς. Για την οροβάγχη στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκαστικό καλύψων της φυτείας. Χρησιμοποιείται μετά τη μετάφυτευση και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε δοχείο για την καταπολέμηση επίτσιων και πολυετών (αγρωστώδων, πλαταύψιλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.


Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι σακούλες ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του διαλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφύου καταστραφούν προπρογευμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύλωσηή/ανάκτηση ενέργειας.

Τελευταία επιμέμαση πριν την συγκομιδή: 7 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες.

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ :
Βλέπε επί της συσκευασίας



ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ρυθμοφόρες. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής πατήστε τα μάτια πλην της αμέσως με αρθρονό νερό και ζητήστε ιατρική συμβούλη. • Φοράτε κατάλληλη προστατε