

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Φοράτε γάντια, μπότρες και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου κατά τη χρήση. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακόλυτα μέρη του σώματος μετά τη χρήση. • Μακριά από παραγωγικά ζώα.

Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό, χορηγήστε νερό αν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Σε κάθε περίπτωση ανάγκης ή αδιαθεσίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή, **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210.77.93.777**

Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Σε περίπτωση τυχαίας διάχυσης, μαζέψτε το προϊόν χρησιμοποιώντας απορροφητικό υλικό και συγκεντρώστε το σε δοχεία που να κλείνουν ερμητικά. Κατόπιν μεταφέρετε τα δοχεία σε εγκεκριμένους χώρους για απόρριψη. Τα κενά μέσα συσκευασίας να ξεπλένονται ενδελεχώς πριν την απόρριψή τους. Μην μολύνετε το περιβάλλον με τις άδειες συσκευασίες του προϊόντος. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε άφθονο νερό.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα: Διατηρήστε το προϊόν σε χώρο προφυλαγμένο, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασία από 5-35°C.

Αρ. Περιόδου: Βλέπε επί της συσκευασίας

KUFER



ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ (β/β):

Χαλκός (Cu) υδατοδιαλυτός 3.0%

Χαλκός (Cu) σε χηλική μορφή με EDTA 3.0%

Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός 0.5%

Σίδηρος (Fe) σε χηλική μορφή με EDTA 0.5%

ΣΤΟΙΧΟΙ-ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Το KUFER είναι υγρό λίπασμα χαλκού και σιδήρου σε χηλική μορφή που δρουν συνεργαστικά μεταξύ τους, ειδικά σχεδιασμένο για την άμεση και αποτελεσματική παροχή των δύο ισχυροστοιχείων στα φυτά και τη θεραπεία των συμπτωμάτων που προκύπτουν από την έλλειψή τους. Έχει ενδοθεραπευτική δράση και η αποτελεσματικότητά του είναι άμεση. Το KUFER είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό σε φυτά με αναγνωρισμένη τροφопενία και δεν προκαλεί φυτοτοξικές επιδράσεις. Σημαντικό πλεονέκτημα του προϊόντος είναι ότι δεν ξεπλένεται από το φύλλωμα.

Προτείνεται για τις καλλιέργειες: αμπέλι, ελιά, τομάτα, πεπόνι, λαχανικά, τεύτλα και καλλωπιστικά.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Εφαρμογές με ψεκασμό φυλλώματος ή υδρολίπωση σε περιπτώσεις αναγνωρισμένης ανάγκης. Πραγματοποιήστε την 1^η εφαρμογή κατά τη βλαστική ανάπτυξη και επαναλάβετε κάθε 15 ημέρες μέχρι την εξοφάνιση των συμπτωμάτων των τροφопενιών. Για καλύτερη σταθερότητα του χηλικού παράγοντα, προτείνεται το pH να κυμαίνεται από 4.0-7.5. Χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων. **Προτείνεται να εφαρμόζεται κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας.**

Καθ. Περιεχόμενο 200 γρ.

Τρόπος παρασκευής του διαλύματος: Γεμίστε το δοχείο του μέσου εφαρμογής με το μισό απαιτούμενο νερό. Προσθέστε τη συνιστάμενη δόση του λιπάσματος στο δοχείο αναδύσεως. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδύση.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Για διαφυλλικούς ψεκασμούς:

Αμπέλι: 300-500 g/100 λίτρα νερό ή 300-500 g/στρέμμα

Ελιά: 500-600 g/100 λίτρα νερό ή 500-600 g/στρέμμα

Πεπόνι: 200-300 g/100 λίτρα νερό ή 200-300 g/στρέμμα

Τομάτα: 300-500 g/100 λίτρα νερό ή 300-500 g/στρέμμα

Λαχανικά: 300-400 g/100 λίτρα νερό ή 300-400 g/στρέμμα

Τεύτλα: 200-400 g/100 λίτρα νερό ή 200-400 g/στρέμμα

Καλλωπιστικά: 200-300g/100 λίτρα νερό ή 200-300g/στρέμμα

Υδρολίπωση: 400-800g/στρέμμα

Παρασκευαστής: GRABI Chemical SpA.

Via Art e Mestieri, 8 - 26030

Gadesco Pieve Demonsi (CR) - Italy.

Αντιπρόσωπος - Διανομέας:



ΑΘΗΝΑ: Φιλέμυκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900

ΘΕΣ/ΜΗΧΗ: Ταχ. Θυράδα 1203, ΒΙ.Π.Ε.Θ. 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9

info@kallifarm.gr