

# Κατάνα®

(Κατάνα)



ΝΕΟ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ



Ψέκασε νωρίς!



- ✓ Ελέγχει **και Δύσκολα Ζιζάνια** όπως Κόνυζα (Κυπαρισσάκι)
- ✓ Με **Μία Εφαρμογή - Μεγάλη Διάρκεια Δράσης**
- ✓ Προτείνεται να εφαρμόζεται από **μέσα Φθινοπώρου έως μέσα Άνοιξης**



Μάθε για το  
**ΔΩΡΟ**  
**ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ!**

Μπορεί να συνδυαστεί  
με Roundup® Gold 36SL  
και Roundup® Ultra 48SL

# Katana®

## Χρόνος Εφαρμογής για όλες τις εγκεκριμένες καλλιέργειες

**ΕΛΙΑ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΑΜΠΕΛΙ:** Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, προτείνεται η εφαρμογή με το **Katana®** να γίνεται στο χρονικό διάστημα:

### Από μέσα Φθινοπώρου μέχρι μέσα Άνοιξης

Ο στόχος είναι κατά το χρόνο εφαρμογής τα φυτρωμένα ζιζάνια να βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης τους. Στο στάδιο αυτό ελέγχονται τα νεαρά ζιζάνια και ταυτόχρονα εμποδίζεται το φύτευμα των νέων σπόρων ζιζανίων. Με την εφαρμογή αυτή, προφυτρωτικά και νωρίς μεταφυτρωτικά, ελέγχονται αποτελεσματικά και για σημαντικό χρονικό διάστημα τα κυριότερα ζιζάνια αυτών των καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων και των δυσκολοεξόντων ζιζανίων όπως λ.χ. η Ήρα, η Κόνουζα, η Μολόχα κ.λπ.\* Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές που πραγματοποιούνται νωρίς εκτός από τα φυτρωμένα ζιζάνια πρέπει να ψεκάζεται και το γυμνό (χωρίς ζιζάνια) έδαφος για να συνδυάζεται η μεταφυτρωτική δράση του **Katana®** με τη προφυτρωτική δράση του και στους σπόρους των ζιζανίων.

## Γενική Δοσολογία

- **10 - 20 γραμμάρια ανά στρέμμα (Αμπέλι, Ελιά, Εσπεριδοειδή)** με όγκο ψεκαστικού υγρού: **20-40 λίτρα ανά στρέμμα. Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά** με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη γραμμή φύτευσης.
- **Στις μεταφυτρωτικές των ζιζανίων εφαρμογές** στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανάγκη για υπολειμματική δράση του ζιζανιοκτόνου προτείνεται ο συνδυασμός του **Katana®** σε χαμηλότερες δόσεις (6 - 8 γρ./στρέμμα) με τις **εγκεκριμένες δόσεις\* Roundup® Gold, Rodeo TF ή Roundup® Ultra. Η συνδυαστική δράση** που διακρίνει τις δύο δραστικές ουσίες, είναι λόγω του διαφορετικού μηχανισμού δράσης με αποτέλεσμα να **διευρύνεται το φάσμα των καταπολεμούμενων ζιζανίων.**

## Παρατηρήσεις\*

- Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή μέσα σε 6 ώρες.
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Να μην ψεκάζετε τα πράσινα τμήματα των καλλιεργειών (οφθαλμούς που έχουν ανοίξει, φύλλα, τσαμπιά, βλαστούς κ.λπ.) άμεσα ή έμμεσα.
- Στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, η εφαρμογή να γίνεται από το **4ο έτος της φύτευσης.**
- Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Να μην εφαρμόζεται σε ελαφριά εδάφη.
- **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ελιά: 45 ημέρες, Εσπεριδοειδή: 45 ημέρες, Αμπέλι: 75 ημέρες**

\* Αναλυτικά για τα είδη ζιζανίων που ελέγχονται προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά ή σε συνδυασμό με σκευάσματα glyphosate, για τη δοσολογία των σκευασμάτων glyphosate και για τις παρατηρήσεις, συμβουλευτείτε την ετικέτα του σκευάσματος ή ζητήστε το Τεχνικό Έντυπο του προϊόντος.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Α.Ε.Κ.: 70161 (Υπ. Αποφ. Τροφ. 6601 / 64442 / 2-10-2017).