



Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/686 μειώθηκαν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (MRLs) της δραστικής ουσίας *chlorpyrifos* σε ορισμένες καλλιέργειες. **Τα μειωμένα MRLs ισχύουν από τις 5-12-2018.** Για την προσαρμογή στα νέα αυτά MRLs το ΥΠΑΑΤ τροποποίησε ανάλογα τις οδηγίες χρήσης όλων των σκευασμάτων που περιέχουν *chlorpyrifos*. Η τροποποιητική απόφαση που αφορά το **CHLORPYRIFOS HEADLAND 48 EC** είναι η αριθ. 8337/110309/ 08.08.2018 με την οποία γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

Για τις εφαρμογές φυλλώματος:

- Αφαιρούνται από το φάσμα δράσης του σκευάσματος οι καλλιέργειες: Καρότο, Κρεμμύδι και Ραπάνια.
- Περιορίζεται ο χρόνος εφαρμογής για τις καλλιέργειες Κυδωνιά, Δαμασκηνιά και Μελιτζάνα σε εφαρμογές πριν την άνθηση.
- Αυξήθηκε το μεσοδιάστημα εφαρμογών στα εσπεριδοειδή σε 60 ημέρες (από 15 ημέρες).

Για τις εφαρμογές εδάφους:

- Αφαιρείται από το φάσμα δράσης του σκευάσματος η χρήση σε: Σπορεία και Καπνοσπορεία.
- Η εφαρμογή εδάφους για την Πατάτα περιορίζεται πριν τη σπορά-φύτευση.
- Για τις καλλιέργειες: Λαχανικά (Καρπούζι, Κολοκύθι, Αγγούρι), Τριφύλλια, Βαμβάκι, Πατάτα, Καπνός, Καλαμπόκι και Σιτάρι τροποποιούνται οι στόχοι, οι δόσεις σκευ. και ο χρόνος εφαρμογής. Συγκεκριμένα οι χρήσεις περιορίζονται στις ακόλουθες:
Καταπολεμά α) Προσάγγουρα, Χλώροπα, Ζάμπρο με δόση max 100κ.εκ/ στρ. (σε λωρίδες ή αυλάκια).
β) Κοφτοσκούληκο με δόση max 130κ.εκ/ στρ. (καθολική εφαρμογή) ή 80κ.εκ/ στρ. (σε λωρίδες ή αυλάκια) **(παραμένει ίδια δόση)**. Εφαρμογή πριν τη σπορά ή φύτεμα. Ομοιόμορφο ψεκασμό και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ.
(αφαιρούνται οι στόχοι καταπολέμησης σε: Σιδηροσκούληκο και Υλέμνια.)

Προστέθηκαν στο φάσμα δράσης οι εξής παρατηρήσεις:

1. Στα εσπεριδοειδή να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο της άνθησης.
2. Βαμβάκι: Το ψεκασμένο φυτικό υλικό να μην χρησιμοποιείται για ζωοτροφή.

Τροποποιήσεις ως προς την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Εσπεριδοειδή: 21 ημέρες (από 30 ημέρες).

Κυδωνιά, Δαμασκηνιά και Μελιτζάνα: Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής (από 30, 20 και 20 ημέρες αντίστοιχα).

Βαμβάκι: 90 ημέρες (από 20 ημέρες).



HELLAFARM A.E.

Για τις υπόλοιπες χρήσεις εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που είχαν καθοριστεί με την αρχική απόφαση άδειας διάθεσης του προϊόντος, οι οποίες όπως και για όλα τα φ.π. πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά (καλλιέργειες, δοσολογία, αριθμός ψεκασμών, τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή).

ΠΡΟΣΟΧΗ!! ενημερώστε τους πελάτες σας με κάθε πρόσφορο επιδεχόμενο ελέγχου μέσο ότι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση του σκευάσματος CHLORPYRIFOS HEADLAND 48 EC σε Καρότο, Κρεμμύδι και Ραπάνια, η χρήση σε Σπορεία και Καπνοσπορεία, καθώς και η χρήση για την καταπολέμηση του Σιδηροσκούληκου και της Υλέμνιας στα Λαχανικά (Καρπούζι, Κολοκύθι, Αγγούρι), Τριφύλλια, Βαμβάκι, Πατάτα, Καπνός, Καλαμπόκι και Σιτάρι για τις εφαρμογές εδάφους. Η χρήση για την Πατάτα για τις εφαρμογές εδάφους περιορίζεται πριν τη σπορά-φύτευση. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε και για τις αλλαγές ως προς την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή όπως ανωτέρω.

Ιδιαίτερα κατά την πώληση συσκευασιών με παλιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης πρέπει να ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες με την παρούσα επιστολή. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου η ενημέρωση θα πρέπει να βεβαιώνεται με καταγραφή στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Εγκρίσεων και Πειραματισμού
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ



HELLAFARM A.E.