

Διαφυλλικό Υγρό Λίπασμα NPK
με Εκχύλισμα Φυκών

Gold Max

ΤΥΠΟΣ: 9 - 9,8 - 7,2 (Μέγιστη Περιεκτικότητα σε νάτριο Na: 0,34%)

Λίπασμα Νέου Τύπου - Ομάδα ΣΤ. Αρ. άδειας κυκλοφορίας: 63

ΣΥΝΘΕΣΗ: Άζωτο (N) 9%, Φώσφορος (P₂O₅) 9,8%, Κάλιο (K₂O) 7,2%

Εκχύλισμα φυκών (κίτοκινίνες, αμινοξέα, υδατάνθρακες και λοιποί ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών)

ΧΡΗΣΗ: Λίπασμα που συνδυάζει τη διεγερτική δράση των φυκών στην αύξηση των φυτών με τα βασικά θρεπτικά συστατικά άζωτο, φώσφορο, κάλιο.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Σπινάκι, κτηνοτροφικά φυτά, βαμβάκι, κηπευτικά, λαχανικά, ψυχανθή, φυτά με εδώδιμο υπόγειο μέρος, αμπέλια και μικροί καρποί, χλοοτάπητες.

ΠΡΟΣΟΧΗ.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

5 Περιεχόμενο
ΛΙΤΡΑ

Παρασκευαστής, Υπεύθυνος διάθεσης:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 1ο κλμ. Λεωφ. Παιανίας - Μαρκοπούλου
Τ.Θ. 100, 19002 Παιανία, Τηλ: 210 6800 900
info@hellafarm.gr www.hellafarm.gr



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πόσωπο - Αποφεύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και κρατήστε τον ζεστό. Για δύσκολες περιπτώσεις, ζητήστε ιατρική βοήθεια. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ρίξτε αργά και με προσοχή άφθονο καθαρό νερό τουλάχιστον για 10 λεπτά. Απομακρύνετε τυχόν φακούς επαφής. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού που επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού που επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Χρησιμοποιήστε μεγάλη ποσότητα νερού, εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. **Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική Θεραπεία.** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793 777

Gold Max

Το **GOLD MAX** περιέχει 9% N, 9,8% P₂O₅ και 7,2% K₂O. Περιέχει επίσης εκχύλισμα από φύκια, με την κατάλληλη συγκέντρωση κυτοκινίνων, αμινοξέων, υδατάνθρακων και άλλων ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών. Αυτά τα συστατικά σε συνδυασμό με την ενίσχυσή του σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο συμβάλλουν στον καλύτερο μεταβολισμό του φυτού και την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων. **Η ευεργετική δράση του GOLD MAX:** Ευνοεί την ανάπτυξη και τη θρέψη των φυτών. Αυξάνει την απόδοση και βελτώνει την ποιότητα παραγωγής. Βελτώνει την πρόληψη των μικροστοιχείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση συμπλήρωση θρεπτικών αναγκών των φυτών κατά το στάδιο της έντονης ανάπτυξής τους. Ο μεταβολισμός του φυτού παρασιιάζεται αυξημένος μετά τη χρήση του **GOLD MAX** με αποτέλεσμα το φυτό να μπορεί να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις stress που προκαλούν αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος και προσβολές από παθογόνα. Η χρήση του **GOLD MAX** λόγω των βιοδιεγερτών που περιέχει, οδηγεί σε φυτά περισσότερο εύρωστα και υγιή με αυξημένα επίπεδα αμυντικών μηχανισμών και λιγότερα προβλήματα ασθένειών στην καλλιέργεια.

Σημείωση: Να μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25° C ή με άπλετο ηλιακό φως. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται τις απογευματινές ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες αποτανθείτε στους γεωπόνους της εταιρείας μας στην περιοχή σας.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΣ ΑΝΑ ΚΑΜΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης.

Γενική δόση εφαρμογής: 300-500 κ.εκ. / στρέμμα με όγκο ψεκαστικού υγρού τουλάχιστον 20λίτρα/στρέμμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΚΑΜΙΕΡΓΕΙΑ:

Λαχανικά (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, μαρούλι, κ.ά.): Εφαρμογή στα αναπτυγμένα φύλλα, πριν το σχηματισμό καρδιάς.

Κηπευτικά (τομάτα, αγγούρι, πεπόνι, κολοκύθι, κ.ά.) Εφαρμογή κατά την έκπτυξη των ανθοφόρων σφραγών.

Ψυχανθή (φασόλια, μπιζέλια κ.ά.): Εφαρμογή λίγο πριν την άνθηση

Φυτά με εδάφιμο υπόγειο μέρος (πατάτα, τεύτλα κ.ά.): Εφαρμογή όταν έχουν αχματιστεί τα 4-6 φύλλα και επανάληψη μετά από 3-4 εβδομάδες.

Αμπέλια και μικροί καρποί: Εφαρμογή στο 80% της πτώσης των πηλιδιών. Επανάληψη μετά τη συγκομιδή και εφόσον παραμένουν αρκετά φύλλα στα κρέμνα.

Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, αραβόσπορος, κ.ά.): Εφαρμογή με την έναρξη του αδελφώματος και αργότερα αν κριθεί αναγκαίο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τα ζιζανιοκτόνα πλατυφύλλων και αγροσωδών.

Κτηνοτροφικά φυτά (τριφύλλι, μηδική, κ.ά.) Εφαρμογή κατά την πλήρη ανάπτυξη. Βελτώνει τη φωτοσύνθεση, την ανάπτυξη των ριζών και τη φυτική μάζα ανά κοπή, για περισσότερες κοπές / χρόνο.

Βαμβάκι: Εφαρμογή με την εμφάνιση των καρποφόρων οργάνων (χτένια) καθώς και στην καρπόδεση.

Χλοοτάπητες (γκάζον, γήπεδο): εφαρμογή στην αρχή της ανάπτυξης και επανάληψη κάθε 6 εβδομάδες καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Για την ανάμιξη απλώς αδειάστε την απαιτούμενη ποσότητα **GOLD MAX** στη μισή ποσότητα από το νερό που θα χρησιμοποιηθεί αναδεύοντας ταυτόχρονα και στη συνέχεια συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό στο δοχείο του ψεκασμού.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν έχει άριστη συνδυαστικότητα οπότε μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους ψεκασμούς που γίνονται αρκεί να συμπίπτονται οι χρόνοι εφαρμογής. Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την ανάμιξη του **GOLD MAX** με άλλα προϊόντα με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στις επικέτες των άλλων προϊόντων προς ανάμιξη. Το **GOLD MAX** δε συνδυάζεται με προϊόντα που περιέχουν μεταλλικά θειικά άλατα (όπως θειικό χαλκό, κ.α), προϊόντα που περιέχουν λάδια, σκευάσματα που περιέχουν metamitron καθώς και με τα λιπάσματα Headland Carnival, Headland Μαγγανίου. Να διαβάζονται πάντα προσεκτικά οι επικέτες των προϊόντων και να ακολουθούνται οι οδηγίες των παρασκευαστών για κάθε προϊόν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό χώρο, προστατευμένο από παγετό και άμεσο ηλιακό φως. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Ημ. παρασκευής, Αρ.παρτίδας: βλέπε στη συσκευασία.