

BRANDT® Manni-Plex® B

Βορίου

Λίπασμα βορίου ταχείας απορρόφησης



Σύνθεση

Αζωτο (N) ολικό σε μορφή ουρίας.....	5,0% β/β
Βόριο (B) υδατοδιαλυτό.....	3,3% β/β

Βοριούχο λίπασμα σε διάλυμα (βορικό νάτριο)

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της ετικέτας πριν τη χρήση. Επιτρέπεται η χρήση μόνο σε καλλιεργητές και εξουσιοδοτημένο προσωπικό εφαρμογής. Για την ασφάλεια ανθρώπων και περιβάλλοντος, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας της ετικέτας. Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο αναγνωρισμένων καλλιεργητικών απαιτήσεων. Μην εφαρμόζετε υψηλότερες δόσεις από τις προτεινόμενες στην ετικέτα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αποκλειστικά για επαγγελματίες χρήστες

Στόχος-πλεονεκτήματα

Το βόριο είναι σημαντικό ιχνοστοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών καθώς ευνοεί την ανθοφορία και τη γονιμοποίηση. Σε βασικά και ασβεστώδη εδάφη όπως επίσης και στα όξινα, αμμώδη, ελαφρά εδάφη παρατηρείται μείωση της διαθεσιμότητας του βορίου με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συμπτώματα τροφοπενίας στα καλλιεργούμενα φυτά. Το BRANDT MANNI-PLEX B βασίζεται σε μία μοναδική τεχνολογία που καθιστά το βόριο άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Πρόκειται για ένα μίγμα σακχάρων και αλκοολών με μικρό μοριακό βάρος που επιτρέπουν την ταχεία απορρόφηση και μετακίνηση του βορίου μέσω του ελκώδους και φλοιώδους παρεγχύματος των φυτών στις ζώνες ανάπτυξης. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το προϊόν ιδανικό για την πρόληψη και θεραπεία των τροφοπενιών βορίου και των συμπτωμάτων που σχετίζονται με αυτή (π.χ. μαύρη καρδιά, κοίλη καρδιά, μικροκαρπία, ανθόρροια κλπ) ενώ παράλληλα βελτώνει την άνθηση και την καρπώδεση.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο όγκο νερού για πλήρη κάλυψη. Η επιλογή της κατάλληλης δόσης, από το προτεινόμενο εύρος, εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας. Συνιστώνται τουλάχιστον δύο εφαρμογές. Για περιπτώσεις σοβαρών τροφοπενιών μπορεί να χρειαστούν περισσότερες εφαρμογές, οι οποίες πρέπει να είναι πραγματοποιηθούν με τη μικρότερη προτεινόμενη δόση.

Διανομέας:



Κελαράφι Α.Ε.
1^η Χλμ., Α. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100
19002, Παιανία, Ελλάδα
Τηλ.: 210.68.00.900
info@hellafarm.gr - www.hellafarm.gr

Περιεχόμενο: 1 λίτρο
Καθαρό Βάρος: ~1,15 kg



Παρασκευαστής:



BRANDT Europe, S.L.
Ctra. Carmona - Guadajoz, Km 3.1
41410 Carmona (Σεβίλλη) Ισπανία
+34 954 196 230
www.brandt.co

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Δοσολογία

Καλλιέργεια	Δοσολογία κ.εκ./ 100 λίτρα νερού	Χρόνος εφαρμογής
Ελιά	200-300	Πριν την άνθηση και μετά την καρπώδεση
Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο)	200-300	Πριν την άνθηση και μετά την καρπώδεση, στην ωρίμανση
Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά κ.ά.) Μηλοειδή (Μηλιά, αχλαδιά) Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινια, νεκταρίνια, βερικοκιά, δαμάσκηνα, κερασιά) Ακτινίδια	200-300	Πριν την άνθηση και μετά την καρπώδεση ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας
Φράουλα	200-300	Πριν την άνθηση και επανάληψη ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας
Φουντουκιά	200-300	Πριν την άνθηση και στην καρπώδεση
Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι, καρπούδι, κολοκύθι, αγγούρι	200-300	Πριν την άνθηση και μετά την καρπώδεση
Καρότο, σέλινο	200-300	Στο στάδιο των 4-6 φύλλων και μετά από 20 μέρες
Τεύτλα	200-300	Στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων και μετά από 15-20 μέρες
Ηλιάνθος	200-300	Από το στάδιο των 6 ως το στάδιο των 10 φύλλων
Πατάτα	200-300	Στην πρώτη φάση βλαστικής ανάπτυξης και στην έναρξη του σχηματισμού κονδύλων
Μαρούλι	200-300	Στο στάδιο των 4-6 φύλλων και μετά από 15 μέρες (διαδοχικές εφαρμογές ανάλογα με το μήκος του κύκλου ανάπτυξης)
Κηπευτικά υπό κάλυψη	200-300	Βλπ τα στάδια ανάπτυξης της αντίστοιχης καλλιέργειας υπαίθρου μειώνοντας κατάλληλα τη δόση
Καλλωπιστικά (τριανταφυλλιά, χρυσάνθεμα, γαρφαλλιά, αζαλέα, καμέλια κ.ά.)	200-300	Πριν την άνθηση με την ανάλογη τεχνική βοήθεια
Καλλωπιστικά υπό κάλυψη (τριανταφυλλιά, χρυσάνθεμα, γαρφαλλιά, αζαλέα, καμέλια κ.ά.)	200-300	Βλπ τα στάδια ανάπτυξης της αντίστοιχης καλλιέργειας υπαίθρου μειώνοντας κατάλληλα τη δόση

Παρατηρήσεις: Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπερβάσει των ενδεικνυόμενων δόσεων.

Συνδυαστικότητα

Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εκτός από τα σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης, τα ορυκτέλαια και τα υπερφωσφορικά λιπάσματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Περιέχει disodium octabate tetrahydrate.

UFI: G361-J0GC-900Y-K64F

Δηλώσεις προφύλαξης

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Φυλάσσετε κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Πρώτες βοήθειες

Σε περίπτωση εισπνοής: Τοποθετήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα, διατηρήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Αν η αναπνοή δεν είναι κανονική ή σταματήσει προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και εφόσον είναι εύκολο. Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο δροσερό και καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε ενδελεχώς το δέρμα με νερό και σαπούνι ή με ένα κατάλληλο καθαριστικό δέρματος. Ποτέ να μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αρωματικά. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική περίθαλψη. Διατηρήστε τον ασθενή σε ανάπαυση. Να μην προκαλέτε ποτέ έμετο. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή όταν τα συμπτώματα αδιαθεσίας επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην χορηγείτε ποτέ σιδήματα από το στόμα σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. Κρατήστε τον παθόντα σε αναπαικτική θέση. Γυρίστε τον/την στην αριστερή πλευρά και μείνετε εκεί όσο περιμένετε για ιατρική φροντίδα.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο κατά το 1/3 έως 2/3 με καθαρό νερό. Προσθέστε τυχόν προσκολλητικά προϊόντα και αναδεύετε για αρκετά λεπτά. Προσθέστε τυχόν φυτοπροστατευτικά προϊόντα και συνεχίστε την ανάδευση για αρκετά λεπτά. Στο τέλος προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα BRANDT MANNI-PLEX B υπό συνεχή ανάδευση μέχρι την πλήρη αναμείξη. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο απαιτούμενο νερό και συνεχίστε την ανάδευση μέχρι την εφαρμογή.

Αποθήκευση και απόρριψη

Μην μολύνετε το νερό, τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές κατά την αποθήκευση ή την απόρριψη του περιεχομένου του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Διατηρείτε σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης (θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 25°C), σε δροσερό και ξηρό χώρο, προστατευμένο από πηγές θερμότητας και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσεται μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και υλικά ισχυρά όξινη ή αλκαλικής αντίδρασης. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΕΡΙΦΕΡΜΕΝΗ ΕΠΙΤΗΔΗ: Ο Κατασκευαστής εγγυάται ότι το Προϊόν συμφώνη με τη χημική περιγραφή που δίδεται στην ετικέτα και είναι κατάλληλη για το σκοπό που δηλώνεται στην χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν παρέχουν καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης της εμπροσφυμότητας ή της καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση. Ο αγροκτήρας και ο Χρήστης αποδέχονται όλους τους κινδύνους που απορρέουν από οποιαδήποτε χρήση αυτού του Προϊόντος. Στην έκταση που προβλέπεται από το νόμο, ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν φέρουν ευθύνη στον αγροκτήρα ή στο χρήστη αυτού του προϊόντος για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική, τυχαία ή έμμεση ζημία.

Όλα τα εμπορικά ονόματα που αναφέρονται στην παρούσα ετικέτα αποτελούν ιδιοκτησία ή διατίθενται άδεια από την BRANDT Europe, S.L. Αριθμός παρτίδας: βλέπε επί της συσκευασίας

