

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: ■ Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά ■ Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές ■ Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε ■ Φοράτε απλή μάσκα γαστιά και λαστιχένια γάντια ■ Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο ■ Να χρησιμοποιείτε ο κατάλληλος περίεκτος για να αποφεύγετε η μόλυνση του περιβάλλοντος.

Πρώτες βοηθείες αντιδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 210 77.93. 777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Καθ. Βάρος:
60 g e



rimisulfuron (ριμσουλφουρόν)
thifensulfuron-methyl (θιφενσουλφουρόν-μεθύλ)



The miracles of science™

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:

rimisulfuron 50 % 6/6

thifensulfuron-methyl 25 % 6/6

Βοηθητικές ουσίες 21,88 % 6/6

Εκλεκτικό μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και επηκον πλατύψυλων ζιζανίων στο καλαμόπι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΦΕΚΑΣΜΟΥΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΤΕΧΝΕΣ

® Σήμα κατατεθέν της E.I. DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
7560/26.1.99/20.11.2003

Παρασκευαστής:
E.I. DuPont de Nemours & Co., (Inc.) Η.Π.Α.

Τυποποιητής και συσκευαστής:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία
Αντιπρόσωπος: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Σολωμόν 12 & Βασ. Γεωργίου -152 32 Χαλάνδρι,
Αθήνα - Τηλ: 210 688 9777 - 9778

Διανομέας:



Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
2 χρόνια

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

K-16007/30709 - GREECE

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK



rimsulfuron (ριμσουλφουρόν)
thifensulfuron-methyl (θιφενσουλφουρόν-μεθύλ)



The miracles of science™

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:	rimsulfuron	50	%	6/6
	thifensulfuron-methyl	25	%	6/6
	Βοηθητικές ουσίες	21,88	%	6/6

Εκλεκτικό μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών
και ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων στο καλαμπόκι.

® Σήμα κατατεθέν της E.I. DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΦΕΚΑΣΜΟΥΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

7560/26.1.99/20.11.2003

Παρασκευαστής: E.I. Du Pont de Nemours & Co, (Inc.) Η.Π.Α.

Τυποποιητής και συσκευαστής: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay,
Γαλλία

Αντιπρόσωπος: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου
152 32 Χαλανδρι, Αθήνα - Τηλ: 210 688 9777 - 9778

Διανομέας:



BLACK

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

■ Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά ■ Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωστροφές ■ Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε ■ Φοράτε απλή μάσκα γυαλιά και λαστιχένια γάντια ■ Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό ■ Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τα κενά υλικά συσκευασίας του ■ Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο ■ Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος.

Πρώτες βοήθειες αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε αμέσως 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή.

Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. (Δείξτε την ετικέττα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Να μεταφερθεί ο άρρωστος στον καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή.


Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από σημαντική έκθεση. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Αν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93. 777

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του.

Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 35 μέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το ΓΚΡΙΝΤ, μίγμα rimsulfuron & thifensulfuron-methyl είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο σουλφονυλουρίας για την καταπολέμηση αγρωστωδών και ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων στο καλαμπόκι. Απορροφάται από το φύλλωμα και των νεαρών ζιζανίων και μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας. Δεν έχει υπολειμματική δράση.

Αμέσως μετά την απορρόφηση το ΓΚΡΙΝΤ σταματά την ανάπτυξη των ευαίσθητων ζιζανίων με ορατά συμπτώματα (κιτρίνισμα νέκρωση και κατόπιν θάνατος) που μπορούν να εκδηλωθούν σε 5-10 μέρες μετά την εφαρμογή.

Μηχανισμός δράσης: Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των σουλφονυλουριών δρούν στο ένζυμο συνθετάση του

οξειγαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ομοιόμορφος ψεκασμός ζιζανίων με πίεση μικρότερη από 3 ατμόσφαιρες (40 p.s.i.) με μπεκ τύπου ριπιδίου και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Άγρωστώδη ζιζάνια: *Alopecurus myosuroides* (αλεπονουρά), *Avena sterilis* (αγριοβρώμη), *Digitaria sanguinalis* (αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα), *Elymus repens* (έλυμος), *Lolium multiflorum* (πολύανθη ήρα), *Poa annua* (κοινή πόα), *Setaria spp.* (σετάριες), *Sorghum halepense* (βέλιουρας).

Πλατύφυλλα ζιζάνια: *Amaranthus hybridus* (καλλιεργούμενο βλήτο), *A. retroflexus* (τραχύ βλήτο), *Capsella bursa-pastoris* (καψέλλα), *Chenopodium album* (λουβουδιά), *Galinsoga spp.* (γκαλινσόγκα), *Gallium spurium* (μικρόκαρπη κολλητσίδα), *Chamomilla recutita* (χαμομήλι), *Mentha spp.* (μέντα), *Polygonum lapathifolium* (λαπάτσα), *Portulaca oleracea* (αντράκλα), *Raphanus raphanistrum* (ραπανίδα), *Senecio vulgaris* (μαρτιάκος), *Sinapis arvensis* (άγριο σινάπι), *Sonchus spp.* (ζωχοί), *Stellaria media* (στελλάρια).

Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια: *Amaranthus blitoides* (πλαγιαστό βλήτο), *Bilderdykia convolvulus* (αναρριχώμενο πολύγονο), *Datura stramonium* (τάτουλας), *Fumaria officinalis* (καπνόχορτο), *Mercurialis annua* (σκαρολάχανο), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά), *Rumex cripus* (λάπαθο), *Xanthium strumarium* (αγριομελιτζάνα).

BLACK

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλαμπόκι: Αγρωστώδη & Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:

Για την καταπολέμηση αγρωστώδων και ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων συνιστάται μεταφυτωτικός ψεκασμός σε δόση 2-2.5 γραμ./ στρέμμα + 0.1% κατ' όγκο μη ιονιζόμενο επιφανειοδραστικό από το στάδιο των 2-6 φύλλων της καλλιέργειας.

Μέγιστη δόση/καλλιεργητική περίοδο: 2.5 γραμ/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η δόση είναι ανάλογη του είδους, του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων. Η μεγάλη δόση πρέπει να χρησιμοποιείται όταν τα ζιζάνια γενικά βρίσκονται στο πιο προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, όταν υπάρχουν και πολυετή ζιζάνια, αιματόχορτο ή ζιζάνια μέτριας ευαισθησίας κ.λ. π.

- Επειδή το ΓΚΡΙΝΤ δεν έχει υπολειμματική δράση, τα αποτελέσματα είναι καλύτερα αν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα περισσότερα ζιζάνια έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο ζωηρής ανάπτυξης, πλατύφυλλα: κοτυληδόνες - 4 φύλλα, αγρωστώδη: 1-3 φύλλα και βέλιουρας: 20-30 cm.

- Η υγρασία του εδάφους και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν τη δράση του ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.

- Η εφαρμογή του συνιστάται να γίνεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 13-25 °C.

- Δεν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει αφού περάσουν 3 ώρες από τον ψεκασμό.

- Να μην εφαρμόζεται σε υγρά από πάχνη φύλλα.

- Με στόχο την αποφυγή ή καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

BLACK

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός ψεκαστήρας. Γεμίζεται πρώτα το βυτίο κατά το 1/4 με νερό, με συνεχή ανάδευση, προστίθεται η απαιτούμενη δόση του σκευασμάτος. Απογεμίζεται το βυτίο ψεκασμού και προστίθεται το επιφανειοδραστικό. Το ψεκαστικό διάλυμα να παρασκευάζεται λίγο πριν την εφαρμογή του. Ξεπλύντε 3 φορές, ή καλύτερα με νερό υπό πίεση τα κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Τα κενά υλικά συσκευασίας καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία φροντίζοντας πάντα να μην μολυνθούν επιφανειακά ή υπόγεια νερά (μακριά από αρδευτικούς ή υδρευτικούς αγωγούς και πηγάδια).

Προσοχή! Τα ψεκαστικά να καθαρίζονται σχολαστικά (θλ. ειδικές προφυλάξεις) μετά τη χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Μη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από καλαμπόκι πριν περάσουν 90 μέρες από την εφαρμογή του.
- Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Μη ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 Atm (40 psi).
- Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

BLACK

- Αμέσως μετά τον ψεκασμό: Είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής:

- ◆ Αδειάστε το βυτίο τελείως και γεμίστε το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Αδειάστε το ξανά.
- ◆ Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε 1 λίτρο οικιακή αμμωνία (περιεκτικότητας 3%) για κάθε 100 λίτρα νερό και απογεμίστε με καθαρό νερό. Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να κυκλοφορήσει το διάλυμα μέσω των σωληνώσεων για τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως. Για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του διαλύματος, ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με άφθονο καθαρό νερό.
- ◆ Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυμα αμμωνίας ίδιας συγκέντρωσης τα μπέκ και τα φίλτρα.
- ◆ Το ψεκαστικό να μην στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

- ◆ Ξεπλύντε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευσίας. Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό.
- ◆ Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση.
- ◆ Τρυπήστε ή κάψτε τα καθαρά κενά υλικά συσκευασίας ή απομακρύνετέ τα με άλλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Το ΓΚΡΙΝΤ δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα κάτω από τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέττας του.

- Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, από τροφοπενίες, από προσβολές παρασίτων, από ασφυξία ριζών κ.λ.π.

BLACK

- Δεν συνιστάται η χρήση του στο γλυκό καλαμπόκι, το καλαμπόκι με λευκούς κόκκους, το υαλώδες καλαμπόκι το ποπ κόρν καλαμπόκι καθαρών σειρών για σποροπαραγωγή.
- Δεν συνιστάται η χρήση του ΓΚΡΙΝΤ επί καλλιεργειών που έχει προηγηθεί εφαρμογή την, ίδια χρονιά με οργανοφωσφορικό κοκκώδες εντομοκτόνο: phorate, terbufos, isofenfos, phonophos & parathion.
- Σε περίπτωση εφαρμογής οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου φυλλώματος αυτή συνιστάται να γίνεται τουλάχιστον 7 μέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του ΓΚΡΙΝΤ.
- Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να σπαρεί μόνο καλαμπόκι.
- Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από καλαμπόκι πριν περάσουν 90 μέρες από την εφαρμογή του.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης: Καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, σε χώρο δροσερό παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

BLACK
[REDACTED]

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ■ Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδά ■ Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτηροφές ■ Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε ■ Φοράτε απλή μάσκα γιαλιών και λαστιχένια γάντια ■ Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο ■ Να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος.
Πρώτες βοηθείες αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΙΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 210 77.93. 777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

K-16007/30709 - GREECE

© Σήμα κατατεθέν της E.I. DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

Καθ. Βάρος:
60 g e



rimsulfuron (ριμσουλφουρόν)
thifensulfuron-methyl (θιφενσουλφουρόν-μεθύλ)



The miracles of science™

Βρέχμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:

rimsulfuron	50	% 6/6
thifensulfuron-methyl	25	% 6/6
Βοηθητικές ουσίες	21,88	% 6/6

Εκλεκτικό μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και επηρωτών πλατύψυλλων ζιζανίων στο καλαμόπιτο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΦΕΚΑΣΜΟΥΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΤΕΧΝΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
7560/26.1.99/20.11.2003

Παρασκευαστής:
E.I. Du Pont de Nemours & Co., (Inc.) Η.Π.Α.

Τυποποιητής και συσκευαστής:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία
Αντιπρόσωπος: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Σολωμός 12 & Βασ. Γεωργίου -152 32 Χαλανδρί, Αθήνα - Τηλ: 210 688 9777 - 9778
Διανομέας:



ΑΘΗΝΑ: Φιλόποιο 10, Αρρένων 151 23 Τηλ: 210 68.03.96-9

ΟΙΔΕ ΝΙΚΗ: Τηλ: Αθηνών 203, Β.Π.Ε.Δ. 57022 Σύδνεος, τηλ: 2310.797.907

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Σταύρος Αγ. Ιωνίου 253 Τηλ.: 22980.22.008-9 e-mail: info@heldas.gr

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
2 χρόνια



ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK