

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διαπνεύστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό. **Αντιδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση ατροπίνης και οξίμης δεν ενδείκνυται. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 77 93 777

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε φυτά μη στόχους να αφήσετε μία αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλοειδή, Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Πυρηνόκαρπα, Ελιές (επιτραπέζιες, ελαιοληπίσιμες), Αμπελία(επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), Βαμβάκι, Καπνός: 7 ημέρες, Ακαλλιέργητες εκτάσεις: --

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, όροσερό και καλά αεριζόμενο.

Αρ. Παρτίδας, Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε άνω μέρος φιάλης

Glexor

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ(SL)

Εγγυημένη Σύνθεση: δραστική ουσία: Glyphosate 36% β/ο (υπο μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,6 % β/ο)

βοηθητικές ουσίες: 58,4% β/β

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
του προϊόντος με αρ. έγκρισης κυκλοφορίας:
70178

Ημερομηνία χορήγησης άδειας παράλληλης εισαγωγής:
03/12/2019 (αρ.πρ. 12167/290055)

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



Παρασκευαστής:
Barclay Chemicals, Ιρλανδία

Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα:



1°χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100,19002, Παιανία,
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Εσπεριδοειδή: (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρουτ, Κιτριά), **Ακρόδρυα:** (Αμυγδαλιά), **Μηλοειδή:** (Μηλιά, Αχλαδιά), **Πυρηνόκαρπα:** (Βερυκοκιά, Νεκταρινιά, Ροδάκινο, Κερασιά), **Αμπελία** (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα) & **Ελιά.** Καταπολεμά:

α) Ετήσια ζιζάνια(*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) με δόση 150-200 κ.εκ. σκ./ στρ. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Μολόχα, Τσουκνίδα, *Polygonum spp.* και Αντράκλα η δόση διαμορφώνεται στα 400-600 κ.εκ. σκ./ στρ. Δύο (2) εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωήρης τους ανάπτυξης. β) Πολυετή ζιζάνια (**) με δόση 500-1000 κ.εκ. σκ./ στρ. (ανάλογα με το είδος του ζιζανίου). Για την Αγριάδα η δόση είναι 750-1000 κ.εκ. σκ./ στρ., για το Βέλιουρα και τη Φτέρη η δόση είναι 500 κ.εκ. σκ./ στρ., για την Περικοκλάδα και το Κίριο η δόση είναι 1000 κ.εκ. σκ./ στρ. Μία (1) εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.

Για την Κύπερη δύο (2) εφαρμογές α) η 1η εφαρμογή κατά την άνθηση με δόση 600 κ.εκ. σκ./ στρ. & β) η 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με δόση 500 κ.εκ. σκ./ στρ.

Βαμβάκι (*)** Καταπολεμά α) Ετήσια ζιζάνια (*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) με δόση 150-200 κ.εκ. σκ./ στρ. β) Πολυετή ζιζάνια (Βελιούρας) με δόση 500 κ.εκ. σκ./ στρ. Μία (1) εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης.

Καπνός: Καταπολεμά Οροβάγγη. Δύο (2) εφαρμογές με ψεκασμούς καλύψεως: α) 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση με δόση 40 κ.εκ. σκ./ στρ. & β) 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση με δόση 60 κ.εκ. σκ. σκ./ στρ.

Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά: Καταπολεμά α) Ετήσια ζιζάνια (*) και β) Πολυετή ζιζάνια (**) με μία (1) εφαρμογή. Δόσεις, τρόπος και χρόνος εφαρμογής ανάλογα με το είδος του ζιζανίου: Σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες.

Ακαλλιέργητες εκτάσεις: Καταπολεμά α) Ετήσια ζιζάνια (**) με δύο (2) εφαρμογές, β) Πολυετή ζιζάνια (**) με μία (1) εφαρμογή. Δόσεις, τρόπος και χρόνος εφαρμογής ανάλογα με το είδος του ζιζανίου: Σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες, και γ) Ξυλωδείς θάμνους, βάτα. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στην πλήρη ανάπτυξη με δόση 500-1000 κ.εκ. σκ./ στρ.

Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών: Καταπολεμά Υδροχαρή ζιζάνια. Μία (1) εφαρμογή κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων με δόση 800-1000 κ.εκ. σκ./ στρ.

Όγκος ψεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/στρ. για όλες τις καλλιέργειες εκτός του Καπνού με όγκο ψεκ. υγρού 30-40 λίτρα/στρ.

(*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιεργεία, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωήρης τους ανάπτυξης.

(**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.

(***) Στο βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτήρων) γύρω από τα μπέκ για την απόφυγη φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.

Παρατηρήσεις: 1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπελία ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επιθυμητές πληγές κλάδεματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.

2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva spp.* (μούλαχα), *Urtica spp.* (τσουκνίδα), *Polygonum spp.*, *Portulaca oleracea* (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κυβ. εκ./στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. 3. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 –30 εκατοστά. 4. Για την φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδιπλωμα της κορυφής. 5. Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 6. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή. 7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 8. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. 9. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.

Τρόπος δράσης: Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. **Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν φυτοτοξικότητας ή συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την οροβάγγη στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλύψεως της φυτείας. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυαστικότητα:** Μην αναμειγνύεται το GLEXOR με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** - Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate. - Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:** - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατέσσερις (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους. - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν. Να μην επιτρέπεται η είσοδος στα ζώα για τις επόμενες 21 μέρες.