goldprint
ετικετοποιία

BUREAU VERITAS Certification
GR11667Q
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ISO 9001: 2008

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE:	ΠΕΛΑΤΗΣ / CLIENT:	BARCODE No:
08-03-2018	ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / CODE:	ΘΕΜΑ / SUBJECT:	
4900013	NOVADIM PROGRESS 1LT	ΚΟΠΤΙΚΟ/DIE CUT: C0957

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/COMMENTS:
Α' ΥΛΗ: GLOSS
ΒΕΝΙΚΙ : GLOSS

KX0020/2

Τα χρώματα του προσχεδίου είναι κατά προσέγγιση της τελικής εκτύπωσης. / The colors of the draft is the approximate final printing.

CMYK COLORS
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

DIECUT
(ΚΟΠΤΙΚΟ ΔΕΝ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ)

150 mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά-Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές-Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.-Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς-Να φοράτε προστατευτικά γάντια-Να φοράτε κατάλληλη μάσκα (FFP2) κατά την διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογή-Να φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή-Η εφαρμογή σε οπωρώνες θα πρέπει να γίνεται μόνο με τρακτέρ εφοδιασμένο με κλειστή καμπίνα -Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό να έχει στεγνώσει.-Να περιμένετε 5 και 21 ημέρες μετά την εφαρμογή προκειμένου να εισέλθετε σε οπωρώνες εσπεριδοειδών για έλεγχο της καλλιέργειας και συντήρηση, αντίστοιχα-Να περιμένετε 2 και 14 ημέρες μετά την εφαρμογή προκειμένου να εισέλθετε στον ελαιώνα για έλεγχο της καλλιέργειας και συντήρηση, αντίστοιχα-Να περιμένετε 5 ημέρες μετά την εφαρμογή προκειμένου να εισέλθετε στην καλλιέργεια με καλλωπιστικά για έλεγχο της καλλιέργειας και συγκομιδή-Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό-Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικους κανονισμούς. **Προφυλάξεις για τους χειριστές:** Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και προστατευτικό προσώπου. Κατά την εφαρμογή με ψεκαστική ράμπα: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και ανθεκτικά παπούτσια. Κατά την εφαρμογή με νεφελοψεκαστήρα: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά παπούτσια και σε περίπτωση οχημάτων χωρίς καμπίνα, επιπρόσθετα κάλυμμα κεφαλής και προσώπου και αναπνευστική συσκευή με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων. Η επανείσοδος στον ψεκασμένο χώρο να γίνεται αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Αποφύγετε την έκθεση του σώματος και φοράτε φόρμα εργασίας και γάντια. Κατά την εφαρμογή με ψεκαστικό αυλό: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά παπούτσια, πλατύγυρο καπέλο και αναπνευστική συσκευή με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων. **«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης»**

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: - Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).- Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε το θύμα σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. -Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ξεπλύνετε το στόμα του θύματος αμέσως και δώστε 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός και αν σας πουν να κάνετε κάτι τέτοιο από το κέντρο δηλητηριάσεων ή ο γιατρός. Ποτέ μη προκαλείτε εμετό ή δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που είναι αναίσθητο ή έχει σπασμούς. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια και πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανισθούν συμπτώματα Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανισθούν συμπτώματα. **Οδηγίες για το γιατρό**: το Dimethoate είναι αναστολέας της χολινεστεράσης που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστημα προκαλώντας αναπνευστική καταστολή.Μεταχείριση της αναστολής χολινεστεράσης: απαιτείται διαδικασία απολύμανσης όπως πλύση όλου του σώματος, πλύση στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα **Αντίδοτο**: αν υπάρχουν συμπτώματα, χορηγήστε atropine sulphate σε μεγάλες δόσεις. 2 έως 4 mg ενδοφλέβια ή ενδομώκά το συντομότερο δυνατόν. Επαναλάβετε ανά 5-10 λεπτά έως τα συμπτώματα ατροπινισμού να εμφανισθούν και διατηρήστε τον πλήρη ατροπινισμό έως ότου όλο το οργανοφωσφορικό μεταβολισθεί. Συμπληρωματικά μπορεί να χορηγηθεί Obidoxime chloride (Toxogonin) ή εναλλακτικά pralidoxime-2-chloride (2-PAM). Όχι όμως σαν αντικαταστάτης του atropine sulphate. Η χορήγηση με oxime μπορεί να συνεχισθεί όσο χορηγείται atropine sulphate Στα πρώτα συμπτώματα πνευμονικού οιδήματος, στον ασθενή πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο και να μεταχειρισθεί συμπτωματικά.Για να αποφευχθεί πιθανή υποτροπή, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για τουλάχιστον 48 ώρες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες. Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για τους οπωρώνες. Για την εφαρμογή σε ελαιώνες θα πρέπει να τηρείται αψέκαστη ζώνη τουλάχιστον 5μ. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε όλα τα είδη ανθοφόρων φυτών (συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών, ζιζανίων ή ανθοφόρων φυτών σε φυτοφράκτες). Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι πρέπει να ενημερωθούν για τις επικείμενες εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση οι μελισσοκόμοι της περιοχής θα πρέπει να ειδοποιηθούν πριν την εφαρμογή.

09/17

Ημ. παρασκευής, Αρ. παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης

NOVADIM PROGRESS 40EC

ΥΓΡΟ
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Dimethoate (Ντιμεθοείτ) 40% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες 61.1% β/β
Χημ.ομάδα οργανοθειοφωσφορικοί εστέρες

Αρ. έγκρ. Κυκλ.:
14389/24-04-2012

Οργανοφωσφορικό διασυστηματικό εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κίνδυνος. Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Τοξικό για τις μέλισσες.

Περιεχόμενο:
1 ΛΙΤΡΟ

Κάτοχος της έγκρισης:
CHEMINOVA AGRO FRANCE S.A.,
21 Anenue Eugene Gazeau,
Senlis 60300 Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

χελλαφαρμ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ:
Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
www.hellafarm.gr - info@hellafarm.gr

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρείπ-φρουτ): για Αφίδες (*Aphis spiraecola syn. Aphis citricola*) με δόση 100-120 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 120-144 κ.εκ./ στρέμμα. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):120. 1ος ψεκασμός στο τέλος της άνθησης και ο 2ος στο 40% του τελικού μεγέθους του καρπού (καρπός με έντονο πράσινο χρώμα). **ΕΛΙΑ:** για Δάκο α) Δολωματικοί ψεκασμοί με δόση 625 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 12,5 κ.εκ./ στρέμμα (200 ml ψεκαστικού υγρού ανά δένδρο/σε 10 δένδρα/στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 2. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 1. Μπορεί να συνδυαστεί με ένα ψεκασμό καλύψεως με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 10 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών. Δολωματικοί ψεκασμοί μικρού όγκου (LV) από το έδαφος σε συνδυασμό με εγκεκριμένο εντομοελκυστικό. Ποσότητα δολώματος 2 λίτρα/στρέμμα. Αρχίζουν συνήθως τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου και επαναλαμβάνονται βάσει των ενδείξεων των δακοπαγίδων, των καταρρίψεων ακμαίων και των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών ελαιοκάρπου. β) Ψεκ. κάλυψης με δόση 80-100 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 96-120 κ.εκ./ στρέμμα. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 120. Ψεκασμοί καλύψεως: Αρχίζουν με την έναρξη της προσβολής και επαναλαμβάνονται όταν διαπιστωθεί ενεργός προσβολή (μεσοδιάστημα επεμβάσεων 14 ημέρες). **ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ, ΑΣΚΑΛΩΝΑ** (εσαλοτ): για Θρίπες (*Thrips tabaci*) με δόση 167-200 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-60 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 30. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες. **ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ** (υπαίθρου): Αφίδες (*Aphis gossypii, Aphis sp, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) με δόση 167-200 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-60 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 30. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά από 14 ημέρες. **ΚΑΡΟΤΟ, ΠΑΣΤΙΝΑΚΗ, ΡΙΖΕΣ ΜΑΙΝΤΑΝΟΥ**: Μύγα του καρότου (*Psila rosae*) με δόση 167-200 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-60 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 30. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 3. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά από 7 ημέρες. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ, ΓΟΓΓΥΛΙΑ**: Αφίδες (*Aphis fabae*) με δόση 250-300 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-60 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 20. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά από 21 ημέρες. **ΣΙΤΗΡΑ** (σιτάρι, σίκαλη, τριτικάλε, σκληρό σιτάρι): Αφίδες (*Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum*) με δόση 250 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 20. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 1. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ** (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Αφίδες (*Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis heredae, Myzys persicae, Macrosiphum rosae, Macrosiphonella sanborni*) με δόση 50-60 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-60 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 100. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά από 14 ημέρες. **Παρατηρήσεις:**1.Το εύρος των δόσεων στις παραπάνω καλλιέργειες εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών. 2.Η αύξηση της συγκέντρωσης πρέπει να αποφεύγεται στις τομάτες. 3. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά την ανθοφορία των καλλιεργειών. 4 .Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν οι πληθυσμοί των αφίδων μπορούν να παράγουν μελίτωμα. 5. Μην εφαρμόζετε το προϊόν πριν από άρδευση. 6 .Μην εφαρμόζετε το προϊόν, όταν αναμένονται τις επόμενες ημέρες βροχοπτώσεις. 7. Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά το πέρας της πτήσης των μελισσών, αργά το απόγευμα. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.
Τρόπος εφαρμογής: α) Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος μέχρι απορροής β) Δολωματικοί ψεκασμοί μικρού όγκου από εδάφους
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: α) για τους ψεκασμούς φυλλώματος: γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. β) για τους δολωματικούς ψεκασμούς: πλέον των ανωτέρω προσθέτουμε και την ελκυστική ουσία στο μισογεμισμένο με νερό δοχείο του ψεκαστικού, αφού προηγουμένως τη διαλύσουμε σε λίγο νερό. Στην περίπτωση αυτή η ανάδευση πρέπει να είναι εντονότερη. **Καθαρισμός ψεκαστήρα**: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύντε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:**1) Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλες οι καλλιεργητικές τεχνικές καθώς επίσης οι φυσικές και βιολογικές μέθοδοι προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός και έτσι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των επεμβάσεων στον ελάχιστο απαιτούμενο για αποτελεσματικό έλεγχο. 2) Το σκεύασμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και χρόνο εφαρμογής και με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος 3) Να ψεκάζετε μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο με βάση το κατώφλι επικινδυνότητας (εάν υπάρχει) και με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τους ωφέλιμους οργανισμούς 4) Να κάνετε επισκόπηση της ευαισθησίας των πληθυσμών. Να αποφεύγετε την επακόλουθη χρήση σκευασμάτων που περιέχουν dimethoate και να εφαρμόζετε το σκεύασμα σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης και ομάδες με διασταυρωτή ανθεκτικότητα (οι πυρεθρίνες και τα καραβαμιδικά σκευάσματα έχουν δείξει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τα οργανοφωσφορικά) όπως τα οργανοφωσφορικά.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Είναι δυνατόν να εμφανιστούν φυτοτοξικά συμπτώματα σε ορισμένες ποικιλίες τομάτας και βαμβακιού . Να αποφεύγεται η αύξηση της συγκέντρωσης στην τομάτα. Προκαλεί φυτοτοξικότητα στην ποικιλία ελιάς «Λιανολιά Κερκύρας». Αυξημένες δόσεις σε ψεκασμούς πλήρους καλύψεως φυλλώματος προκαλούν φυτοτοξικότητα στην ποικιλία ελιάς «Κονσερβολιά».
Να μη χρησιμοποιείται στα καλλωπιστικά: *Adianthum, Aralia Sieboldii, Asparagus plumosus, Begonia multiflora, Coleus hybridus, Calceolaria rugosa, Chrysanthemum indicum, Cissus antartica, Ficus pandurata, Nephrolepsis, Sanchzia, Sinningia speciosa, Gloxinia, Pteris (tremula, ensiformis, evergemensis), Salvia splendens*.Να μη χρησιμοποιείται στα καλλωπιστικά του γένους PRUNUS, στα χρυσάνθεμα και στην αζαλέα. Μπορεί να προκαλέσει σκωριώχρωση σε μερικά καλλωπιστικά. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο πευκο-κουκουναριά. Πριν τη χρήση του στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα. Να μην εφαρμόζεται σε φυτά που υποφέρουν από στρες (έλλειψη νερού, πάγο ή ζημιά από ζιζανιοκτόνα. Να μην εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός.
Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με βορδιγάλειο πολτό και αλκαλικά σκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν θειάφι
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:Ελιά: 28 ημέρες, Εσπεριδοειδή: 120 ημέρες, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνα (εσαλότ): 14 ημέρες, Τομάτα, Μελιτζάνα: 21 ημέρες, Καρότο, Παστινάκη, ρίζες Μαϊντανού: 35 ημέρες, Ζαχαρότευτλα, Παντζάρια, Γογγύλια:28 ημέρες, Σιτηρά: Τέλος άνθησης, Καλλωπιστικά: Δεν έχει εφαρμογή.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος**: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μακριά από θερμοκρασίες παγετού και θερμοκρασίες που να μην ξεπερνούν τους 25°C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

266 mm

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ.: 19 300 - ΤΗΛ.: 2105577118, 2105577119, 2105580030 - FAX: 2105577075 • www.goldprint.gr • e-mail: goldprint@ath.forthnet.gr
ANAPAFSEOS & MPOUMPOULINAS STR. 19 300 ASPROPYRGOS, ATHENS, GREECE - TEL.: +30 2105577118, 2105577119, 2105580030 - FAX: 2105577075 • www.goldprint.gr • e-mail: goldprint@ath.forthnet.gr

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΑΚΕΤΑ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΑΛΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

I ACCEPT THE ABOVE MODEL AS WAS SENT BY THE CREATIVE DEPARTMENT OF THE COMPANY

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE