212

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ***Σε περίπτωση εισπνοής:*** Απομακρύνετε τον παθόντα και κρατήστε τον σε αναπαυτική θέση και ζεστό. Για δύσκολες περιπτώσεις, ζητήστε ιατρική βοήθεια. ***Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:*** Ρίξτε αργά και με προσοχή άφθονο καθαρό νερό τουλάχιστον για 10 λεπτά. Απομακρύνετε τυχόν φακούς επαφής. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού που επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. ***Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:*** Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ζητήστε ιατρική συμβουλή. ***Σε περίπτωση κατάποσης:*** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα με νερό, χορηγείστε μεγάλη ποσότητα νερού, και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Συνδυαστικότητα: Να αποφεύγεται η ανάμιξη με σκευάσματα που περιέχουν χαλκό ή κασσίτερο επειδή μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα. Συνδυάζεται με λιπάσματα και φυτοφάρμακα ωστόσο πριν την ανάμιξή του προτείνεται μικρή δοκιμή συνδυαστικότητας.
Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό χώρο. Διατηρήστε το μακριά από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Προσοχή: Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του προϊόντος από τους Γεωπόνους της Εταιρείας και το ειδικό φυλλάδιο που διαθέτουμε.
Σημείωση: Η Εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. εγγυάται την ελεγμένη σύνθεση του προϊόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα της χρήσης αυτού, άσχετα αν αυτή έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως ή όχι για τυχόν ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, που οφείλονται στην αποθήκευση ή χρησιμοποίηση του προϊόντος. Κάθε αγορά θεωρείται ότι είναι σύμφωνη με τους ανωτέρω όρους.

Το 14% του μίγματος αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας τοξικότητας και το 24% από συστατικά άγνωστης περιβαλλοντικής τοξικότητας

ALBION®
PLANT NUTRITION

ΜΕΤΑΛΟΖΕΪΤ

ΜΟΥΛΤΙΜΙΝΕΡΑΛ

MM

Σύνθεση: Σίδηρος 0,5%, Ψευδάργυρος 0,5%,Ασβέστιο 1%, Μαγνήσιο 1%, Χαλκός 0,5%, Μαγγάνιο 0,5%, Άζωτο 3%(οργανικό), Μολυβδένιο 0,1%
Λίπασμα νέου τύπου - ομάδα στ
Ποσοστό υδρολυμένης φυτικής πρωτεΐνης /συνολική: 100%

Αρ. Άδειας κυκλοφορίας: 53

Χηλικές ενώσεις αμινοξέων με μέταλλα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προϊόν Η.Π.Α. Της: ALBION

Αποκλειστική διανομή -
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
χελλαφαρμ A.E.
1° χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002, Παιανία,
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Το **ΜΕΤΑΛΟΖΕΪΤ ΜΟΥΛΤΙΜΙΝΕΡΑΛ** προορίζεται για την πρόληψη και θεραπεία ανωμαλιών στη θρέψη των φυτών, που προέρχονται από έλλειψη ή ανισορροπία γενικώς διαφόρων ιχνοστοιχείων και που εμφανίζονται σαν τροφοπενίες, μείωση της παραγωγής, της ποιότητας κ.λπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η δοσολογία καθορίζεται από το είδος της καλλιέργειας, το στάδιο της ανάπτυξης και τη σοβαρότητα της τροφοπενίας. Οι μέγιστες δόσεις συνιστώνται για φυτά πλήρους ανάπτυξης. Για εφαρμογή σε μικρότερα φυτά πρέπει να μειωθεί ανάλογα η δοσολογία.
-Φυτά μεγάλης καλλιέργειας, λαχανικά, κηπευτικά, πατάτα. Δόση 120-240 κ.εκ/στρ. Εφαρμογή κατά την περίοδο ταχείας ανάπτυξης ή έντονων θρεπτικών αναγκών. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί δύο ή περισσότερες φορές ανά καλ/κή περίοδο.
-Καρποφόρα δένδρα: Δόση 120-360 κ.εκ./στρ. Έναρξη των εφαρμογών στην αρχή της ανάπτυξης. Οι εφαρμογές μπορεί να επαναληφθούν καθ'όλη την καλ/κή περίοδο με μεσοδιάστημα 2-4 εβδομάδων.
-Αμπέλια και μικροί καρποί (μούρα): Δόση 120-240 κ.εκ/στρ. Έναρξη των εφαρμογών στην αρχή της ανάπτυξης. Οι εφαρμογές μπορεί να επαναληφθούν καθ'όλη την περίοδο αύξησης με μεσοδιάστημα 1 ή περισσότερων εβδομάδων.

Παρατηρήσεις:
-Στα πυρηνόκαρπα να εφαρμόζεται μόνο κατά το διάστημα από την καρπόδεση ωσότου η διάμετρος του καρπού φθάσει τα 2,5εκ.
- Διαλύστε ένα μέρος του προϊόντος σε 20 ή περισσότερα μέρη νερού. Να μην εφαρμόζεται αδιάλυτο.
-Χρησιμοποιείστε κατάλληλη ψεκαστική συσκευή και όγκο ώστε να επιτευχθεί πλήρης κάλυψη των φυτών.
- Σε φυτά στα οποία είναι δύσκολη η διαβροχή του φυλλώματος (π.χ. κηρώδη φύλλα) συνιστάται η χρήση μη ιονικού διαβρεκτικού παράγοντα.

Αρ. παρτίδας/Ημ. παραγωγής: βλέπε επί της φιάλης

Περιεχόμενο: 1 Λίτρο