

ΠΡΟΥΠΟΛΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Αποθηκεύεται μακριά από πρόχειρα ποτά και υακρίσματα. Μην τρώτε, πιείτε ή καπνίσετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε να συναντήσετε τα ψεκαστικά σπασίδια. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον πακέτο του προϊόντος ή την ετικέτα. Συνιστάται να φοράτε γάντια και μάσκα μιας χρήσης για αεροζόλ (EN149 FFP3 ή αλληλ ανάλογη) κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
-**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**
-Ποτέ μην *Cydia pomonella granulovirus*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Αποφύγετε αμέσως τυχόν υψώματα ή βήματα στον αέρα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπύε το στομάχι αμέσως. Δεν υπάρχει αντίδοτο.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

Μην μιμνήστε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του! Για την προστασία των υδάτινων οργανισμών πρέπει να τηρείτε απόσταση (ώδη 5m από το επιφανειακό νερό).

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα των σκευασμάτων: Στην αρχή και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε ερμό και προστασία γαλάτι απορρογόντων θερμοκρασιών πάνω από 5 °C, διατηρείται για 2 χρόνια σε θερμοκρασία μικρότερη των 5°C. Σε θερμοκρασία μικρότερη των -18 °C, διατηρείται για απεριόριστο χρονικό διάστημα χωρίς να υποβαθμίζεται.

Αθήνα, Παπάγου - Ήμερα Παρασκευές - Ήμερα Αργία/Βλέπει επί της συσκευασίας

MADEX-TOP

Cydia pomonella granulovirus (CrGV) isolate V15
(Ιός του τύπου κοκκιδιογόνων για καρπόκαθα) 3X10¹¹ OB/L

ΑΑΔΑ: 14.474/13-3-2014 Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: *Cydia pomonella granulovirus* (CrGV) isolate V15 (CrGV-V15) 3X10¹¹ OB/L
Βοηθητικές ουσίες 55,2% β/β

Μικροβιακό εντομοκτόνο
(*Cydia pomonella granulovirus*)
για την καταπολέμηση των προνυμφών
της καρπόκαψας. Δρά μέσω της κατάποσης.
Οι μολυσμένες προνύμφες
πεθαίνουν μετά από μερικές ημέρες.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο: 100 κ.εκ.

Κάτοχος της άδειας:
Ανδρέας Βασιλείου Σπυρίδης,
Τοπ. Δύστη Ζελεστή, 8, 79618
Ριωνέσιον (Βαθιά, Γαλλία)
Υπεύθυνος επικοινωνίας -
Υπεύθυνος για την τελική
έκδοση στην αγορά:
ΧΕΛΛΟΦΑΡΜ ΑΕ

ΧΕΛΛΟΦΑΡΜ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ:
Φιλίππου 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.00.00.000
www.hellafarm.gr - e-mail: info@hellafarm.gr

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΗΘΟΔΙΑ (Μηλιά, Αχλαδιά, Καϊνίδια, Αχλαδιάρια (MASHI)), ΚΑΡΥΔΙΑ: για την καταπολέμηση των προνυμφών της καρπόκαψας. Δόση 8-25 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 10 κ. ε.κ./ στρέμμα (μίσκιο). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 40-120. Ένεση ψεκασμού πριν την εκκένωση των πρώτων προνυμφών. Επανάληψη κάθε 8-14 ημέρες (ανάλογα με την ηλικία των κ.ε.ε.). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργεια/ημερίδα: 10 (πριν 5 εφαρμογές ανά νερό).

*Επανάληψη εφαρμογής κάθε 8 ημερών/εξαιρέσεις (2 μερικές ημερών/εξαιρέσεις μετρες αντισταγονίου σε μια ημερομηνία). Οι ψεκασμοί να πραγματοποιούνται νεαρό το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης (με ψεκαστήρα οπίσθιο από τρακτέρ, μηχανοκίνητο ή επώνιο). **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με το απαιτούμενο νερό. Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν τη χρήση. Προσθέστε την ποσότητα σκευασματος που αναγράφει στην ετικέτα με θέλετε να κατασκευάσει και αναδεύστε. Για να επιτευχθεί η καλύτερη αποτελεσματικότητα το pH του ψεκαστικού υγρού πρέπει να κυμαίνεται από 5-8,5.

Καθαρμός ψεκαστικού μηχανήματος: Μετά την εφαρμογή ιδιαιτέρως τελείως το βυθό εφαρμογής και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό το βυθό και όλα τα μέρη του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το βυθό και ξεπλύνετε πάλι με καθαρό νερό. Μην ξεπλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής και μη ρίχνετε τα νερά του ξεπλύματος, κοντά σε υδάτινους πόρους.

Συνδυαστικότητα: Να μην συνδυάζεται το προϊόν με οποιαδήποτε άλλο προϊόν που μπορεί μεσοεί ή να αυξήσει το pH του ψεκαστικού υγρού κάτω από 5 ή πάνω από 8,5. Να μην συνδυάζεται με χημικά σκευασματα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογόνες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποφευχθεί: - Το προϊόν είναι ευαίσθητο στην υπεριώδη ακτινοβολία γι' αυτό είναι προτιμότερο οι ψεκασμοί να εφαρμόζονται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. - Χρησιμοποιείται νερό με pH 5-8. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν προσθέστε κατάλληλο buffer. - Κατά τον ψεκασμό το φυτό δεν πρέπει να είναι υγρό από βροχή ή σταγονίδια δροσιάς. - Κατά τον ψεκασμό εφόσον υπάρχει εναπομείνουσα κάλυψη ολόκληρου του φυτού.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευασμα: 6 ώρες.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στο φυτό ή το προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Τελικότητα επίβλαση πριν τη συγκομιδή: Μελισσόφιλη, Καρυδοφιλή, Τριτοφιλή.
Οδηγίες για την ασφαλή απόθεση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Το κενό μέσο συσκευασίας (φιάλες) ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται πρώτο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταπολεμηθούν προληπτικώς με τριτοφιλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποθείνεται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση/ανάκτηση ενέργειας.