

ΧΕΛΓΚΑΡ 25 WG

Fenoxycarb 25% (φενοξικάρμπι)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη Σύνθεση: fenoxycarb 25% β/β

Αρ. Εγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.&Τ:

Βοηθητικές ουσίες 73,95% β/β

14216/12-03-08

Καρβαμιδικό εντομοκτόνο. Ρυθμιστής αυξήσεως των εντόμων που δρα δι' επαφής και από στομάχου. Εμποδίζει τη μεταμόρφωση των προνυμφών ή την εκκόλαψη των αυγών (ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση). Δεν έχει ακμαιοτόνο δράση.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΩΦΕΚΑΣΜΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ (γραμ / 100 λίτρα ψεκ. υγρού) - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά) καταπολεμά τον Κηροπλάστη και το Λεκάνιο. Ψεκασιμός μόλις εμφανιστούν οι κινητές μορφές με δόση 20-40. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα) 150. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά) καταπολεμά α) Φυλλορύκτες (*Phyllonorycter corylifoliella*, *Ph. blancardella*, *Chemistoma scitella*, *Lyoneila spp.*), εφαρμογή με την έναρξη της εναπόθεσης των αυγών, που συνήθως συμπίπτει με το μέγιστο της πτήσης των ακμίων με δόση 50. β) Φυλλοδέτες εφαρμογή με την εμφάνιση των προνυμφών του τελευταίου σταδίου με δόση 40. γ) Καρπόκαφη ψεκασιμός με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων με δόση 40. δ) Ψύλλα αχλαδιάς, εφαρμογή κατά την άνοδη μέχρι και τις αρχές του καλοκαιριού που ο πληθυσμός είναι ακόμα χαμηλός και δεν υπάρχει υπέρθεση των γενιών, ιδίως κατά την έναρξη του σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης με δόση 100. ε) Κοκκοειδή (*Quadraspidiotus perniciosus*) εφαρμογή όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια με δόση 150. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα) 150. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ καταπολεμά α) τους Φυλλοδέτες, ψεκασιμός με την εμφάνιση των προνυμφών του τελευταίου σταδίου με δόση 40 και β) τα Κοκκοειδή (*Quadraspidiotus perniciosus*, *Pseudalacaspis pentagona*) εφαρμογή όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια με δόση 150. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα) 150. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΑΜΠΕΛΙ καταπολεμά την Ευδεμίδα και την Κογγυλίδα, εφαρμογή με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων των αυγών με δόση 20-40. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα) 150. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΕΛΙΑ καταπολεμά το Λεκάνιο, εφαρμογή όταν το 65% του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια με δόση 40. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα) 150. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Παρατηρήσεις: Το εύρος των δόσεων (όπου υπάρχει) εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασιμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

- Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα 3/4 με νερό.
- Ρίχνουμε, χωρίς προδιάλυση, την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος.
- Αναδεύουμε καλά και συμπληρώνουμε μέχρι επάνω με νερό.

Φυτοτοξικότητα: Το εντομοκτόνο ΧΕΛΓΚΑΡ 25 WG δεν είναι φυτοτοξικό, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Συνδυαστικότητα: Ειδικά όταν χρησιμοποιείται στην αχλαδιά να μην αναμειγνύεται με ορυκτέλαια.

Καθαρό βάρος: 300 γραμ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ :

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. - Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας αφού τα πλύνετε καλά με νερό. - Πλύνετε τα χέρια και τα ακλόνητα μέρη του σώματος πριν πάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

" Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης."

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο : Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστάψτε τον από την υποθερμία. - Σε περίπτωση υποθερμίας καλέστε αμέσως γιατρό. - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε γιατρό. - Σε περίπτωση κατάποσης και εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του, χορηγήστε σε επανάληξη ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. Μην προκαλέσετε εμετό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210.77.93.777

Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον.

Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΕΙΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι σάκοι και οι σάκοι ξεπλένονται από πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυντος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κομμάτια που θα καταστραφούν προηγούμενος με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

-Εσπεριδοειδή: 45 ημέρες. -Μηλιά, ροδάκινο, αμύγδα: 20 ημέρες.

-Αχλαδιά: 30 ημέρες -Ελιά: 60 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος :

Στην αρχική και απαράβατη συσκευασία του σε καλά αεριζόμενο, ξηρό και δροσερό χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΜ. ΑΝΕΞ.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ελέγξτε επί της συσκευασίας

Κάτοχος Εγκρίσης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και ονόμαση: **ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.** Φελέμνικ 15, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:



ΑΘΗΝΑ: Φελέμνικ 15, Μαρούσι 151 23, Τηλ.: 210.68.00.900-9
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.Π.Ε. Θ., 57022 Σίνδος, Τηλ.: 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr