

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προσφυλάξεις: -Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. -Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.-Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. - Να αποφύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον.-Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις σύνηγεις χρήσης».

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ζεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαίρεστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ζεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέως. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαίρεστε αμέως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τη ξαναφορέστε. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέως γιατρό (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

HELDOX

48SL

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ(SL)

Εγγυημένη σύνθεση: Dicamba (υνικάμπα) 48 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 52.55 % β/β

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 70093/29-7-2014

Καταπολέμηση πλαταύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

Περιέχει το δραστικό συστατικό dicamba, οποίο απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο:
600 κ.εκ.

Κάτοχος της άδειας -
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



AΘΗΝΑ:
Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
www.hellafarm.gr - e-mail: info@hellafarm.gr

Φάσμα δράσης: Για την καταπολέμηση των πλαταύφυλλων ζιζανίων: Τραχύ Βλήτο, Λουβαδιά*, Μεγάλη περικοκλάδα, Κίρσιο*, Πολυκόμπι**, Περικοκλάδα*, Τάτουλας* στον αραβόσιτο. Μία εφαρμογή με καθολικό ψεκασμό μεταφυτρωτικά στο στάδιο BBCN 12-18 της καλλιέργειας (2-8 φύλλα έχουν εκπτυχθεί) με δόση 60 κ.εκ. /στρέμμα και όγκο ψεκασμού υγρού 20 λίτρα/ στρέμμα.

Παρατηρήσεις:* Μετρίως ευαίσθητα ζιζανία. ** Μετρίως ανθεκτικά ζιζανία.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικά με ψεκαστήρα υψηλού όγκου, μπέκ τύπου σκούπας και πιεστήμικροτερη από 3 Atm και ποσότητα ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα το στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μεσην με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και απογεμίζουμε το δοχείο. Τα κενά υλικά συσκευασίας ζεπλένονται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ζεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περιατέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε: Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργεια αραβοσίτου που προορίζεται για σποροπαραγωγή.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σπόρας ή φύτευσης των καλλιέργειών που ακολουθούν: Δεν υπάρχει κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων στην αμειψισπορά των αροτριάων καλλιέργειών. Κάθε καλλιέργεια που ακολουθείται σε προγράμματα αμειψισποράς μετά τον αραβόσιτο, μπορεί να φυτευτεί το φθινόπωρο μετά τη συγκομιδή αραβοσίτου ή την επόμενη άνοιξη. Απαιτείται άροση πριν από τη σπόρα/ φύτευση των καλλιέργειών που θα ακολουθήσουν.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στην προτεινόμενη καλλιέργεια και δόση.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος: Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραίταση συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Αρ. Παρτίδας, Ημερ. Παρασκευής, Ημ. Λήξης: Βλέπε άνω μέρος φιάλης