

Δηλώσεις προφύλαξης: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. **Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.** Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. –Μην καπνίζετε. Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/σταγονίδια/ εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. **Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό». «Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια» Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου θα πρέπει να περάσουν 4 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος και την εξαπόλυση εντόμων επικονίασης και 14 ημέρες για την εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:** Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777**

Ημ.Παραγωγής, Αρ. Παρτίδας: βλέπε φιάλη

LAITOR

ΑΑΔΑ: 14781/ 31.08.2021

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: abamectin 1,8 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 97,8 % β/β

ΥΓΡΟ

ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (ΕC)

Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής κατά των κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από αστία, σε διάστημα 3-5 ημερών από τον ψεκασμό.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

UFI: J0Q0-F0YP-D004-5T85



ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.

Περιεχόμενο: 1 ΛΙΤΡΟ



Κάτοχος της άδειας: LAINCO S.A.

PoL Ind. Can Jordi, Avda. Bizet, 8-12, 08191 Rubí, Barcelona, Ispania

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



1° χλμ. Α. Παιανίας Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100, 19002, Παιανία, Τηλ.: 210.68.00.900, www.hellafarm.gr, e-mail : info@hellafarm.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Φράουλα (Θ): Καταπολεμά α) Κίτρινο Τετράνυχο και *Phytonemus pallidus*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. β) Λιριόμυζα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50-100 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (15-100 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/ στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ. ανά καλλ. περίοδο ανά μεσοδιάστημα εφαρμ. σε ημέρες:** 1 – 2 / 7. **Τομάτα (Θ):** Καταπολεμά α) Κίτρινο Τετράνυχο, *Eryophyidae* (*Aculops lycopersici*) και *Polyphagotarsonemus latus*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. β) Λιριόμυζα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50-100 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (15-100 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/ στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ. ανά καλλ. περίοδο ανά μεσοδιάστημα εφαρμ. σε ημέρες:** 1 – 3 / 7. **Μελιτζάνα (Θ):** Καταπολεμά Κίτρινο Τετράνυχο. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. **Δόση:** 50-80 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (15-80 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/ στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ. ανά καλλ. περίοδο ανά μεσοδιάστημα εφαρμ. σε ημέρες:** 1 – 3 / 7. **Κολοκύθα (Θ), Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ), Κολοκύθα (Θ):** Καταπολεμά α) Κίτρινο Τετράνυχο. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. β) Λιριόμυζα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **Δόση:** 50-100 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (15-100 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/ στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ. ανά καλλ. περίοδο ανά μεσοδιάστημα εφαρμ. σε ημέρες:** 1 – 2 / 7.

Παρατηρήσεις: Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό δοχείο την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία abamectin η οποία ανήκει στην ομάδα **6 κατά IRAC**. Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο), εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με ακαρεοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: όλες οι καλλιέργειες: 3 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητα. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.