



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.06.2022  
Αριθ. πρωτ: 4169/115585

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Γ. Τσολομούτη  
Τηλέφωνο: 210 9287247  
e-mail: [gtsolomiti@minagric.gr](mailto:gtsolomiti@minagric.gr)

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20,  
Τ.Κ. 15125, Μαρούσι  
email: [ioannis.tsoutsanis@bayer.com](mailto:ioannis.tsoutsanis@bayer.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθμό 70344 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RODEO PLUS (Glyphosate υπό μορφή οξέος 36% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή καθώς και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού.
  - β) Τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - γ) Τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - δ) Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  - ε) Τον κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).

4. Την από το Μάρτιο του 2022 έκθεση αξιολόγησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για τη διεύρυνση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RODEO PLUS SL (MON76879) (Αρ. πρωτ. 2872/83399/29.03.2022).
5. Την αριθμ. 4226/88994/25.07.2019 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) RODEO PLUS (glyphosate υπό μορφή οξέος 36% β/ο), με ΑΑΔΑ 70344, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την αριθμ. 4817/127382/14.05.2021 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 1502/46111/21.02.2022 και 4169/115585/04.05.2022 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Τροποποιούμε την με αριθμό 70344 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RODEO PLUS (Glyphosate υπό μορφή οξέος 36% β/ο), που χορηγήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 4226/88994/25.07.2019 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή καθώς και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών:

Συγκεκριμένα τα σημεία **5, 6, 11, 13** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSI	Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)	200	10-40	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξης.	1-3* (ανά 28 ημέρες)
	Μανταρινιά CIDRE	Μολόχα <i>Malva</i> sp	400-600		
Λεμονιά CIDLI	ΜΑΛSS Τσουκνίδα <i>Urtica</i> sp	400-600		URSS	
Γκρέιπ φρουτ CIDPA	Πολυκόμμι <i>Polygonum</i> sp		POLSS		
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά PRNDU	Αντράκλα <i>Portulaca oleracea</i>	POROL			
Καρυδιά IUGRE	Πολυετή ζιζάνια		500-1000	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.	1*
Φουντουκιά CYLAN	Αγριάδα <i>Cynodon dactylon</i>	750-1000	CYNDA		
Μηλοειδή Μηλιά	Βέλιουρας <i>Sorghum halepense</i>	500		SORHA	
Αχλαδιά MABSD	Φτέρη <i>Pteridium aquilinum</i>	500	PTEAQ		
PYUCO					

<b>Πυρηνόκαρπα</b> Βερικοκιά PRNPN Ροδακινιά PRNPS Κερασιά PRNAV Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) Ελιά OLVEU (επιτραπέζια και ελαιοποιήσιμη) Ακτινιδιά ATICH Μπανανιά MUBPA	Περικοκλάδα <i>Convolvulus            arvensis</i> CONAR	1000			
	Κίρσιο <i>Cirsium arvense</i> CIRAR	1000			
	Κύπερη <i>Cyperus sp</i> CYPSS	1 <sup>η</sup> 600 2 <sup>η</sup> 500	1 <sup>η</sup> στην άνθηση 2 <sup>η</sup> σε περίπτωση αναβλάστησης	2*	
Πριν τη φύτευση/σπορά	Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)	200 Ως ανωτέρω	10-40	Ως ανωτέρω	1-2** (ανά 28 ημέρες)
Μετά τη συγκομιδή και πριν την κατεργασία για σπορά	Ως ανωτέρω				1*
Λειβαδικές εκτάσεις	Πολυετή ζιζάνια Ως ανωτέρω	400-600 Ως ανωτέρω			1*
Αγρανάπαυση		200-1000 Ως ανωτέρω			1-2* (ανά 28 ημέρες)
<b>Βαμβάκι            GOSHI</b>	Ετήσια ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα) Ως ανωτέρω	150 - 200	10-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με καλύπτρα μεταξύ των γραμμών. <u>Ετήσια ζιζάνια:</u> Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωικής τους ανάπτυξης. <u>Πολυετή ζιζάνια:</u> Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται πριν την άνθηση ή μετά από αυτή.	1
	Πολυετή ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα) Ως ανωτέρω	500			

\* Μέγιστη δόση/εφαρμογή: 360 γρ δο/στρέμμα – Μέγιστη δόση/καλλιεργητική περίοδο: 360 γρ δ.ο./στρέμμα  
 \*\*Μέγιστη δόση ανά εφαρμογή: 216 γρ δο/στρέμμα - Μέγιστη δόση/καλλιεργητική περίοδο: 360 γρ. δ.ο./στρέμμα

#### Παρατηρήσεις:

1. **Η χρήση στην λεμονιά περιλαμβάνει και την κιτριά.**
2. Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως 1-2 εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.
3. Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως 1 εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.
4. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια, ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3<sup>ο</sup>) έτος από τη φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
5. **Στο Βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών της καλλιέργειας. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στην καλλιέργεια**
6. Οι δόσεις ποικίλουν σύμφωνα με την ευαισθησία του ζιζανίου και τον τύπο του ψεκαστικού μέσου (οι υψηλότεροι όγκοι νερού απαιτούν την υψηλότερη αναφερόμενη δοσολογία).
7. Σε περίπτωση ύπαρξης ζιζανίων διαφορετικής ευαισθησίας χρησιμοποιείστε τη συνιστώμενη δόση του λιγότερου ευαίσθητου ζιζανίου.
8. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva* spp (μολόχες), *Urtica* spp (τσουκνίδες), *Polygonum* spp. (πολυκόμμι, λαπάτσα), *Portulaca oleracea* (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ./στρέμμα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους.
9. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκατοστά.
10. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να μη γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες από τον ψεκασμό.  
 Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή.  
 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.  
 Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.  
 Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές.

**Να χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά εφαρμογής ή γεωργικές τεχνικές ώστε το σκεύασμα ή το ψεκασμένο έδαφος να μην έρχεται σε επαφή με τα διάφορα μέρη (καρποί, φύλλωμα, βλαστοί, κορμοί κ.α.) των καλλιεργειών.**

#### Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία glyphosate, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 9 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**P234:** Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και της εφαρμογής.»

Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή, φοράτε μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια.

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**Sp1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αυλές αγροκτημάτων και δρόμους.**Spe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους

- να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή
- χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά **50% για την καλλιέργεια του βαμβακιού** και κατά 75 % για τις υπόλοιπες καλλιέργειες.

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Πορτοκαλιά (0110020), Μανταρινιά (0110050), Λεμονιά (0110030), Γκρέιπ-φρουτ (0110010), Κιτριά (0110030-002), Αμυγδαλιά (0120010), Καρυδιά (0120110), Φουντουκιά (0120060), Βερικοκιά (0140010), Ροδακινιά (0140030), Κερασιά (0140020), Ακτινιδιά (0162010), Μπανανιά (0163020), Ελιά (επιτραπέζια-0161030 και ελαιοποιήσιμη-0402010), Αμπέλι (επιτραπέζιο-0151010 και οινοποιήσιμο-0151020),	28
<b>Βαμβάκι (0401090)</b>	<b>30</b>
Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας και αρκετά πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά, Αγροί πριν τη σπορά της καλλιέργειας	-

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- **4 additional GAP-compliant SEU residue trials should be submitted at post-authorisation for cotton , to complete required dataset.**

Γ Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 4226/88994/25.07.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**