

Pottok

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
400 Κ.ΕΚ

- ▶ **ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΥΓΡΟ (SL) fatty alcohol**
- ▶ **Εγγυημένη σύνθεση:**
Alcohols, C9-11, ethoxylated propoxylated 99,8% β/β
Βοηθητικές ουσίες 0,2% β/β
- ▶ **ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΖΙΖΑ
ΝΙΟΚΤΟΝΑ**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ | ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ |
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ | ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ ΑΡ.
ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

Παρασκευαστής:
ASCENZA AGRÔ S.A.
Avenida do rio Tejo,
Herdade das Praias 2910-
440 Setubal, Πορτογαλία

Διανομέας:
ROVENSA I&E
Μεσογειών 396, 15341,
Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 211 10 32000
e-mail: info.greece@
ascenza.rovensa.com

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προφυλάξεις: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.
UFI: D71T-34KV-083Q-HVSR



Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο βυτίο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Κατηγορία και τρόπος χρήσης:

Το Pottok είναι ένα μη ιονιζόμενο επιφανειοδραστικό σκεύασμα. Συνιστάται η προσθήκη του POTTOK στο βυτίο σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα PLAZA 25 WG (rimsulfuron 25%), OBELISK (iodosulfuron + mesosulfuron) και ZEPOS (iodosulfuron + mesosulfuron) για την αποτελεσματικότερη δράση του ζιζανιοκτόνου. Αυξάνει την προσκολλητική και διεισδυτική ικανότητα

του ψεκαστικού διαλύματος στα φύλλα των ζιζανίων. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα δράσης του ζιζανιοκτόνου. Εξασφαλίζει σταθερή και με διάρκεια δράση της δραστικής ουσίας που περιέχει το ζιζανιοκτόνο.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΔΟΣΕΙΣ:

Τρόπος εφαρμογής: i. **Στις καλλιέργειες αραβοσίτου, τομάτας και πατάτας:** σύμφωνα με τον τρόπο εφαρμογής που αναγράφεται στην ετικέτα του ζιζανιοκτόνου PLAZA 25 WG (rimsulfuron 25%). ii. **Στις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών (Σιτάρι σκληρό και μαλακό, Σίκαλη και Όλυρα):** σύμφωνα με τον τρόπο εφαρμογής που αναγράφεται στην ετικέτα του ζιζανιοκτόνου ZEPOS (iodosulfuron + mesosulfuron). iii. **Στις καλλιέργειες χειμερινό σιτάρι μαλακό και σκληρό, χειμερινή σίκαλη, τριτικάλε και σίτο σπύλα:** σύμφωνα με τον τρόπο εφαρμογής που αναγράφεται στην ετικέτα του ζιζανιοκτόνου OBELISK (iodosulfuron + mesosulfuron).

Δόση: 20 κ.εκ./σπρ

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με το εγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο PLAZA 25 WG (rimsulfuron 25%), OBELISK (iodosulfuron + mesosulfuron) και ZEPOS (iodosulfuron + mesosulfuron) καθώς και λοιπά εγκεκριμένα σκευάσματα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, με τα οποία συνδυάζεται.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ακολουθούνται οι οδηγίες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με το οποίο συνδυάζεται.

Χρονική σταθερότητα -Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασίες > -10oC και <40oC.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ευθύνη του παρασκευαστή περιορίζεται στην προμήθεια του προϊόντος στην σφραγισμένη αρχική συσκευασία, στη χρήση σύμφωνα με τη συνιστώμενη δοσολογία. Οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την αποθήκευση, τον χειρισμό, και τη χρήση είναι ευθύνη του χειριστή.