

BRANDT® Manni-Plex® Titan



Λίπασμα ιχνοστοιχείων ταχείας απορρόφησης

Σύνθεση

Άζωτο (N) ολικό.....	5,0%
2,3% β/β Ουρικό άζωτο	
2,7% β/β Νιτρικό άζωτο	
Βόριο (B).....	0,25%
Σίδηρος (Fe).....	1,0%
Μαγγάνιο (Mn).....	2,5%
Από το οποίο υδατοδιαλυτό Mn.....	2,5%
Ψευδάργυρος (Zn).....	2,0%

Λίπασμα EK Υγρό μείγμα θρεπτικών ιχνοστοιχείων (νιτρικός σίδηρος, ψευδάργυρος, μαγγάνιο & βορικό νάτριο). Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της ετικέτας πριν τη χρήση. Επιτρέπεται η χρήση μόνο σε καλλιεργητές και εξουσιοδοτημένο προσωπικό εφαρμογής. Για την ασφάλεια ανθρώπων και περιβάλλοντος, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας της ετικέτας. Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο αναγνωρισμένων καλλιεργητικών απαιτήσεων. Μην εφαρμόζετε υψηλότερες δόσεις από τις προτεινόμενες στην ετικέτα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Στόχος-πλεονεκτήματα

Το BRANDT MANNI-PLEX TITAN βασίζεται σε μία μοναδική τεχνολογία που καθιστά τα θρεπτικά συστατικά του άμεσα διαθέσιμα στα φυτά. Πρόκειται για ένα μίγμα σακχάρων και αλκοολών με μικρό μοριακό βάρος που επιτρέπουν την ταχεία απορρόφηση και μετακίνηση των θρεπτικών συστατικών μέσω του ξυλώδους και φλοιώδους παρεγχύματος των φυτών στις ζώνες ανάπτυξης και τους καρπούς. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το προϊόν ιδανικό για την πρόληψη και θεραπεία των τροφωπενιών μαγγανίου και των συμπτωμάτων που προκαλούν, βελτιώνει την παραγωγή και την ποιότητα της καλλιέργειας.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο όγκο νερού για πλήρη κάλυψη. Η επιλογή της κατάλληλης δόσης, από το προτεινόμενο εύρος, εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας. Συνιστώνται τουλάχιστον δύο εφαρμογές. Για περιπτώσεις σοβαρών τροφωπενιών μπορεί να χρειαστούν περισσότερες εφαρμογές, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν με τη μικρότερη προτεινόμενη δόση.

ΛΙΠΑΣΜΑ EK

Δοσολογία

Καλλιέργεια	Δοσολογία κ.εκ./ 100 λίτρα νερού	Χρόνος εφαρμογής
Ελιά	250 - 500	Πριν την άνθηση και μετά την καρπώδεση
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)	250 - 500	Πριν την άνθηση και μετά την καρπώδεση, στην ωρίμανση
Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά κ.ά)		
Μηλοειδή (Μηλιά, αχλαδιά)	250 - 500	Πριν την άνθηση και μετά την καρπώδεση ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά)		
Ακτινιδιά		
Φράουλα	250 - 500	Πριν την άνθηση και επανάληψη ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας
Φουντουκιά	250 - 500	Πριν την άνθηση και στην καρπώδεση
Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθι, αγγούρι	250 - 500	Πριν την άνθηση και μετά την καρπώδεση
Καρότο, σέλινο	250 - 500	Στο στάδιο των 4-6 φύλλων και μετά από 20 μέρες
Μαρούλι	250 - 500	Στο στάδιο των 4-6 φύλλων και μετά από 15 μέρες (διαδοχικές εφαρμογές ανάλογα με το μήκος του κύκλου ανάπτυξης)
Κηπευτικά υπό κάλυψη	250 - 500	Έλη τα στάδια ανάπτυξης της αντίστοιχης καλλιέργειας υπαίθρου μειώνοντας κατάλληλα τη δόση
Αραβόσιτος, τεύτλα	250 - 500	Στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων και μετά από 15-20 μέρες
Ηλιανθός	250 - 500	Από το στάδιο των 6 ως το στάδιο των 10 φύλλων
Πατάτα	250 - 500	Στην πρώτη φάση βλαστικής ανάπτυξης και στην έναρξη του σχηματισμού κονδύλων

Παρατηρήσεις: Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο κατά το 1/3 έως 2/3 με καθαρό νερό. Προσθέστε τυχόν προσκολλητικά προϊόντα και αναδεύστε για αρκετά λεπτά. Προσθέστε τυχόν φυτοπροστατευτικά προϊόντα και συνεχίστε την ανάδευση για αρκετά λεπτά. Στο τέλος προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα BRANDT MANNI-PLEX TITAN υπό συνεχή ανάδευση μέχρι την πλήρη ανάμιξη. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο απαιτούμενο νερό και συνεχίστε την ανάδευση μέχρι την εφαρμογή.

Συνδυαστικότητα

Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εκτός από τα σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης, τα ορυκτέλαια και τα υπερφωσφορικά λιπάσματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαυματα και οφθαλμικές βλάβες. Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει disodium octaborate tetrahydrate & manganese dinitrate.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/άμεσα αποτιμηκή προστασία για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Πρώτες βοήθειες

Σε περίπτωση εισπνοής: Τοποθετήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα, διατηρήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Αν η αναπνοή δεν είναι κανονική ή σταματήσει να αναπνέει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο καθαρό και δροσερό νερό τουλάχιστον για 10 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. Μην επιτρέψετε στον παθόντα να τριβεί την προσβεβλημένη οφθαλμική περιοχή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε εξονυχιστικά το δέρμα με νερό και σαπούνι ή με κατάλληλο καθαριστικό δέρματος. ΠΟΤΕ να μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αρασιτικά. Προτείνεται η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού της άτομα που παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό. Διατηρήστε τον ασθενή σε ηρεμία. Μην προκαλείτε ΠΟΤΕ εμετό. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή όταν τα συμπτώματα αδιαθεσίας επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην χορηγείτε ποτέ οινόπνευμα από το στόμα σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. Κρατήστε τον παθόντα σε αναπαικτική θέση. Γυρίστε τον/την αριστερή πλευρά και παραμείνετε στο σημείο όσο περιμένετε για ιατρική φροντίδα.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Αποθήκευση και απόρριψη

Μην μιγνύετε το νερό, τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές κατά την αποθήκευσή ή την απόρριψή του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Διατηρείται σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης (θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 25°C), σε δροσερό και ξηρό χώρο, προστατευμένο από πηγές θερμότητας και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσεται μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και υλικά ισχυρά όξινης ή αλκαλικής αντίδρασης. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ: Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν αναμειγνύεται με τη ζητημένη περιγραφή που δέχεται στην ετικέτα και είναι κατάλληλο για το σκοπό που δηλώνεται στον χρησιμοποίησή σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Ο κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν φέρουν ευθύνη στην εφαρμογή ή στη χρήση αυτού του προϊόντος. Στην έκταση που προβλέπεται από το νόμο, ο κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν φέρουν ευθύνη στην εφαρμογή ή στη χρήση αυτού του προϊόντος για οποιαδήποτε επαγγελματία, ειδικά, τζοαίρα ή έμπορο ζώμα.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα ετικέτα αποτελούν ιδιοκτησία ή διαθέτουν άδεια από την BRANDT Europe, S.L. Αριθμός παρτίδας βλέπε επί της συσκευασίας

Διανομέας

Κελαράφι Α.Ε.
1^η χλμ., Α. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100
19002, Παιανία, Ελλάδα
Τηλ.: 210.68.00.900
info@hellafarm.gr - www.hellafarm.gr

Περιεχόμενο: 1 λίτρο
Καθαρό βάρος: ~1,2 kg

Παρασκευαστής:

BRANDT Europe, S.L.
Ctra. Carmona - Guadajoz, Km 3.1
41410 Carmona (Σεβίλλη) Ισπανία
+34 954 196 230
www.brandt.co

FORMULATED IN USA
MANUFACTURED IN EU

