

(Ρούφραστ Νόβα)

RUFAS NOVA

ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ

ΣΕ ΘΡΙΠΑ, ΤΕΤΡΑΝΥΧΟ ΚΑΙ ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ!

Abamectin




Acrinathrin



Θρίπας της Καλιφόρνιας: Σοβαρός εκθρός πολλών καλλιεργειών. Η ζημιά στο σταφύλι είναι ιδιαίτερα σοβαρή και διαπιστώνεται στις ράγες με καστανούς μεταχρωματισμούς, υποβαθμίζοντας την ποιότητα. Ο θρίπας επισκέπτεται το αμπέλι στην έναρξη της ανθοφορίας και εναποθέτει τα αυγά του στις μικρές ράγες και στο βόστρυχο του σταφυλιού. Οι νεαρές νύμφες τρέφονται στην επιφάνεια των νεαρών ραγών και εισέρχονται κάτω από την καλύπτρα που δεν έχει ακόμη αποβληθεί.

Τζιτζικιάκι: Είναι σημαντικός εκθρός για το αμπέλι. Βρίσκονται συνήθως στην κάτω επιφάνεια των φύλλων όπου τρέφονται με το ρύγχος τους στα νεύρα. Παρατηρείται έτσι ένα καφέπιασμα από τα τσιμπήματα, καρούλιασμα, σκλήρυνση και μεταχρωματισμός. Είναι φορείς σοβαρών ιώσεων του αμπελιού.

Τετράνυχος: Τα συμπτώματα από προσβολές τετρανύχων σε αμπέλι μπορεί να εμφανίσουν νέκρωση ματιών, βραχυγονάτωση, σχισίματα και παραμόρφωση φύλλων, μείωση βλάστησης, μεταχρωματισμοί νεύρων και περιφερειακή νέκρωση φύλλων, μη ικανοποιητική ωρίμανση κληματίδων και υποβάθμιση ποιότητας των σταφυλιών.



Σχηματική παράσταση του τρόπου δράσης του Rufast Nova, που συνδυάζει τοπικά διεισδυτική και διελασματική δράση με δράση επαφής

Το Rufast Nova συνδυάζει δύο δραστικές ουσίες και δράση με επαφή και από στομάχου

Abamectin

Η **Abamectin** απορροφάται γρήγορα από την επιφάνεια των φυτικών ιστών και διεισδύει στο εσωτερικό των φύλλων. Στην συνέχεια κινείται διελασματικά, με αυτό τον τρόπο προστατεύεται από την έκλυση από βροχή. Παραμένει δραστική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δρα κυρίως με επαφή αλλά και κατάποση σε έντομα και ακάρεα.



Acrinathrin

Η **Acrinathrin** είναι συνθετικής μορφής εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο που διαθέτει ταχεία δράση επαφής και από στομάχου.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: ΑΜΠΕΛΙ. Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

ΕΧΘΡΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ			ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	κ.εκ. ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού	Όγκος ψεκαστικού υγρού. Λίτρα ανά στρέμμα	κ.εκ. ανά στρέμμα	
Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i>	100	100	100	Με την εμφάνιση των πρώτων νυμφών
Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana, Euroecilia ambiguella</i>				Με την εμφάνιση της προσβολής
Ακάρεα <i>Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini, Calepitymerus vitis</i>				Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών
Τζιτζικιάκι <i>Empoasca vitis, Scaphoideus titanus</i>				Με την εμφάνιση της προσβολής
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ			21 ημέρες	
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (Μ.Α.Ε.)			1	

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Α.Α.Α. 14.506 (ΥΠ. ΑΠΟΦ. ΤΡΟΠ.: 8485/8137/16-01-2018)