

PERLKA

ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ - ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΚΥΑΝΑΜΙΔΗ

Το PERLKA είναι λίπασμα ασβεστούχου κυαναμίδης με πολλαπλή δράση. Εφοδιάζει τα φυτά με άζωτο ενώ παράλληλα αυξάνει τη γονιμότητα του εδάφους και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπόρων ζιζανίων και την ανάπτυξη των ασθενειών και παρασίτων εδάφους.

Σύνθεση (β/β): Ολικό άζωτο (N) 19.8%- Νιτρικό άζωτο (N) 1.5%
Βασικό συστατικό της αζωτούχου κυαναμίδης,
εκφραζόμενο ως οξειδίο του ασβεστίου (CaO) 50%

| Καλλιέργεια | Δοσολογία | Χρόνος εφαρμογής |
|--|---------------------|--|
| Εσπεριδοειδή | 40 κιλά/ στρέμμα | 2 εβδομάδες πριν την έκπτυξη της νέας βλάστησης |
| Καρυδιά | 40 κιλά/ στρέμμα | 2 εβδομάδες πριν την έκπτυξη της νέας βλάστησης |
| Μηλοειδή (Μηλιά, αχλαδιά) | 30-40 κιλά/ στρέμμα | 2 εβδομάδες πριν την έκπτυξη της νέας βλάστησης |
| Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, κερασιά, δαμασκηλιά) | 40 κιλά/ στρέμμα | 2 εβδομάδες πριν την έκπτυξη της νέας βλάστησης |
| Ελιά | 40 κιλά/ στρέμμα | 2 εβδομάδες πριν την έκπτυξη της νέας βλάστησης |
| Ακτινιδιά | 40 κιλά/ στρέμμα | 2 εβδομάδες πριν την έκπτυξη της νέας βλάστησης |
| Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο) | 30-40 κιλά/ στρέμμα | 2 εβδομάδες πριν την έκπτυξη της νέας βλάστησης |
| Φράουλα | 40-50 κιλά/ στρέμμα | 8-10 ημέρες πριν τη φύτευση |
| Καρότο, σπανάκι, άνηθος | 60 κιλά/ στρέμμα | 12-15 ημέρες πριν τη σπορά ή τη φύτευση |
| Κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, πεπόνι, αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθι, μελιτζάνα, μαρούλι, αντίδι | 50 κιλά/ στρέμμα | 10-12 ημέρες πριν τη σπορά ή τη φύτευση |
| Πατάτα, τομάτα, πιπεριά | 40 κιλά/ στρέμμα | 8-10 ημέρες πριν τη σπορά ή τη φύτευση |
| Αγκινάρα | 40 κιλά/ στρέμμα | 15 ημέρες πριν το ξύπνημα |
| Σπαράγγι | 40 κιλά/ στρέμμα | Μετά το τέλος της συγκομιδής και μετά την ισοπέδωση του αγρού ("ξεσαμάρωμα") |
| Φασόλι | 30 κιλά/ στρέμμα | 6-8 ημέρες πριν τη σπορά ή τη φύτευση |

Στόχος-πλεονεκτήματα: Το λίπασμα PERLKA είναι λίπασμα πολλαπλής δράσης. Παρέχει το απαραίτητο άζωτο στα φυτά σταδιακά καλύπτοντας τις ανάγκες τους καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο. Επιπλέον παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπόρων των ζιζανίων και την ανάπτυξη των ασθενειών και παρασίτων του εδάφους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμογή με διασπορά του προϊόντος στην επιφάνεια του εδάφους και ελαφρά ενσωμάτωση. Το έδαφος πρέπει να παραμένει υγρό κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών μετά την εφαρμογή.

Ημερομηνία παραγωγής / αρ. παρτίδας: βλέπε συσκευασία
see on each side panel



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει calcium cyanamide, CAS 156-62-7; calcium dihydroxide, CAS 1305-62-0

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.



Προφυλάξεις Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Πρώτες βοήθειες: **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 25 ΚΙΛΑ

Παρασκευαστής: AlzChem AG,
Dr-Albert-Frank-Str. 32, D-83308 Trostberg Germany
Αντιπρόσωπος, διανομέας για την Ελλάδα: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,
Φλέμινγκ 15, 15123, Μαρούσι, τηλ. 2106800900



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr