

Περιέχει *Cydia pomonella granulovirus*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δηλώσεις Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Αποφύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε γάντια, μάσκα και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία. **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση εισπνοής: (αυτό είναι δυνατό μόνο με έκθεση σε ζεστό προϊόν), μετακινήστε το παθόντα στον δροσερό αέρα, τοποθετήστε τον σε ημι-όρθια θέση και χαλαρώστε τα ρούχα. Σε περίπτωση δύσπνοιας, παρέχετε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού, συμβουλευτείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ανασηκώστε τα βλέφαρα για να εξασφαλίσετε ενδελεχή πλύση. Σε περίπτωση ερεθισμού, συμβουλευτείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δεν είναι γνωστά συμπτώματα ή τυπικές επιδράσεις. Δεν υπάρχει αντίδοτο. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210793777**

Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους

MADEX TWIN

Συμπυκνωμένο
εναιώρημα (SC)

ΑΑΔΑ: 14751-14.07.2020

Εγγυημένη Σύνθεση:

δραστική ουσία: 3×10^{13} granules CpGV/L (44,8% β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 55,2% β/β

**Μικροβιακό εντομοκτόνο
(*Cydia pomonella granulovirus*) για την
καταπολέμηση των προνυμφών της καρπόκαμψας.
Δρα μέσω της κατάποσης. Οι μολυσμένες
προνύμφες πεθαίνουν μετά από μερικές ημέρες.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Περιεχόμενο: 100 κ.εκ.

Υπεύθυνος για
την τελική διάθεση στην αγορά:

Κάτοχος της έγκρισης:
Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6, 6146
Grossdietwil, Ελβετία

 **HELLAFARM** Α.Ε.
1^ο χλμ. Λ. Παιονίας Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100,
19002, Παιονία, Τηλ.: 210.68.00.900,
info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

Αριθμ. Πρωτοκόπ.
Παρασκευαστ.
Ημερ. Λήξης:
Βλέπε επί της
συσκευασίας

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΚΙΑ

MADEX TWIN

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΑΑΔΑ: 14751-14.07.2020

Εγγυημένη Σύνθεση:
δραστική ουσία: 3 x 10¹³ granules CpGV/L (44.8% β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 55.2% β/β

Μικροβιακό εντομοκτόνο (Cydia pomonella granulovirus) για την καταπολέμηση των προνυμφών της καρπόκαψας. Δρα μέσω της κατάποσης. Οι μολυσμένες προνύμφες πεθαίνουν μετά από μερικές ημέρες.

Περιέχει *Cydia pomonella granulovirus*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Πληροφορίες για τη φύση των ειδικών κινδύνων και τις πρώτες βοήθειες αναγράφονται στην ετικέτα επί της φιάλης

Κάτοχος της έγκρισης: Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6, 6146, Grossdietwil, ΕΛΒΕΤΙΑ
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



1^η χλμ. Α. Παϊνίας Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100,19002, Παλαιά,
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα NASHI, Μουσουλιά) για την καταπολέμηση της Καρπόκαψας της Μηλιάς (*Cydia pomonella*) και του βλαστορύκτη της Ροδακινιάς (*Grapholita molesta*).
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά) και Αμυγδαλιά για την καταπολέμηση του βλαστορύκτη της Ροδακινιάς (*Grapholita molesta*).

Καρυδιά για την καταπολέμηση της Καρπόκαψας της Μηλιάς (*Cydia pomonella*). Εναρξη ψεκασμών πριν την εκκόλαψη των πρώτων προνυμφών με δόση: 12.5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (10 κ.εκ./στρ) και όγκο ψεκ.υγρού: 80 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο ανά μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: Για την καταπολέμηση της *Cydia pomonella* 9 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 6-8 ηλιόλουστες μέρες. Για την καταπολέμηση της *Grapholita molesta* 12 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 6-8 ηλιόλουστες μέρες (2 μερικώς ηλιόλουστες ημέρες αντιστοιχούν σε 1 ηλιόλουστη).

Παρατηρήσεις:

1. Η 1η εφαρμογή να γίνεται 85 ημεροβαθμούς μετά το πρώτο ζεστό βράδυ με δραστηριότητα πτήσης. Το κατώτερο θερμοκ όριο για την ανάπτυξη της καρπόκαψας είναι οι 10° C.
2. Προτείνονται 3 εφαρμογές ανά γενιά.
3. Ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο στα μηλοειδή είναι 12.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με το απαιτούμενο νερό. Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν τη χρήση. Προσθέστε την ποσότητα σκευάσματος που αναλογεί στην επιφάνεια που θέλετε να ψεκάσετε και αναδεύσατε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το βυτίο εφαρμογής και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το βυτίο και ξεπλύνετε πάλι με καθαρό νερό. Μην ξεπλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής και μη ρίχνετε τα νερά του ξεπλύματος κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Καρυδιά, Αμυγδαλιά: 1 ημέρα.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Για να επιτευχθεί η καλύτερη αποτελεσματικότητα το pH του ψεκαστικού υγρού πρέπει να κυμαίνεται από 5-8.5. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν προσθέστε κατάλληλο διορθωτή pH. Κατά τον ψεκασμό τα φυτά δεν πρέπει να είναι υγρά από βροχή ή σταγόνες δροσιάς. Κατά τον ψεκασμό εξασφαλίστε ομοιόμορφη κάλυψη ολόκληρου του φυτού. Επιτρέπεται η χρήση του Madex Twin κατά την άνθηση και κατά τις περιόδους παραγωγής μελιτωμάτων όταν οι μέλισσες δεν είναι παρούσες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικών πληθυσμών, προτείνεται εναλλαγή του Madex Twin με εντομοκτόνα που έχουν διαφορετικούς τρόπους δράσης ή με στελέχη του ιού CpGV αποτελεσματικά στα ανθεκτικά στελέχη. Ως μέτρο προφύλαξης, προτείνεται η αποφυγή της χρήσης του προϊόντος για την καταπολέμηση δύο διαδοχικών γενεών του εντόμου οπότε μειώνεται αντίστοιχα ο μέγιστος αριθμός ψεκασμών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε ξηρό, σκοτεινό και δροσερό χώρο σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C. Διατηρείται για 2 χρόνια σε θερμοκρασία μικρότερη των 5°C.