


Bobina esca fresca 200 g - fascia 350 / p.t. 255 mm

MCZ - svolgimento A (scende di piede) - pinna a sinistra



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Γενικές οδηγίες: Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε. Πριν από κάθε χρήση τρωκτικοκτόνων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες). Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές πηγές τροφής των τρωκτικών (π.χ. χιμώνα δημητριακών ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή του δολωματος. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε χώρους όπου έχει παρατηρηθεί προηγούμενη δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φαλές, χώροι απόψησης, τρύπες, λογάκια, κλπ.). Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές. Μην ανοίγετε τη φακέλακια που περιέχουν το δόλωμα. Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και άγρια εκτροφής και άλλα ζώα μη σποράς. Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκέλη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά. Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε σωστήματα αποστράγγισης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το άνω εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος. Απομακρύνετε τυχόν υπόλοιπα δολωμάτων ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής. Αφίστε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. παγιδέματα τρωκτικών, απομάκρυνση όσο το δυνατόν μακρύτερα πιθανής τροφής και πόσιμου νερού) για τη βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής. Μη χρησιμοποιείτε τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολωμάτα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών).

**BRODITOP NEXT PASTA FLUO-NP**  
Ετοιμοχρησιμοποιήσιμο τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή πάστες (τύπος προϊόντος 14)  
Εγγ. σύνθεση: Brodifacoum 0.0029% β.β., Βοηθητικές ουσίες 99.9971% β.β.  
Περιέχει τον μικροβιολογικό παραγοντικό δεσφαιλιόμιο δεσφαιλιόμιο.  
Χρώμα: ανοικτό κόκκινο  
Αριθ. Εγγρ. Κουίλεφ (ΥΑΑ&Τ): TTT14-0125 / 21-8-2017

**Μεθόδους εφαρμογής:** Δολωματική εφαρμογή.  
**Δόση και συχνότητα εφαρμογής:** Ποντικός (*Mus musculus*) σε εσωτερικούς χώρους: - **Υψηλή προσβολή:** μέχρι 50 γρ. δολωματος ανά θέση δολώσεως κάθε 2 μέτρα. - **Χαμηλή προσβολή:** μέχρι 5 γρ. δολωματος ανά θέση δολώσεως κάθε 5 μέτρα. **Αρουραίοι** (*Rattus norvegicus*) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς (γύρω από κτίρια) χώρους: - **Υψηλή προσβολή:** μέχρι 90 γρ. δολωματος ανά θέση δολώσεως κάθε 5 μέτρα. - **Χαμηλή προσβολή:** μέχρι 90 γρ. δολωματος ανά θέση δολώσεως κάθε 10 μέτρα.

**Οδηγίες χρήσης για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους (για ποντικούς και αρουραίους):** Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) ή κάθε 5 με 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) στην αρχή της εφαρμογής και εν συνεχεία ανά εβδομαδιαία διαστήματα, ώστε να ελεγχτεί η αποδοχή του δολωματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρυνθούν τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επανοδωλώνονται όταν είναι αναγκαίο.

**Οδηγίες χρήσης για εφαρμογή σε εξωτερικούς (γύρω από κτίρια) χώρους (για αρουραίους):** Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας. Αντικαταστήστε τα δολωμάτα στους δολωματικούς σταθμούς που έχουν καταρρεύσει από υγρασία ή λερωθεί. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται μόνο κάθε 5 με 7 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και εν συνεχεία ανά εβδομαδιαία διαστήματα, ώστε να ελεγχτεί η αποδοχή του δολωματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρυνθούν τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επανοδωλώνονται όταν είναι αναγκαίο.

**BRODITOP®**  
**Next Pasta Fluo-NP®**

**ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (ΒΙΟΚΤΟΝΟ)**  
Αντιπηκτικό ετοιμοχρησιμοποιήσιμο τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή πάστες που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ενήλικων και νεαρών σταθίων ανάπτυξης των οικιακών ποντικών (*Mus musculus*) και των κοφρέ αρουραίων (*Rattus norvegicus*) σε εσωτερικούς χώρους και των κοφρέ αρουραίων (*Rattus norvegicus*) σε εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια).

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ)**

Κατάλογος της έγχρωμης Παρασκευαστικής Ομάδας: ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselice (Padova), ITALY  
Φάκελλος 15, 15123 Μορούφι, Τηλ. 210 68 00 900, www.bellafarm.gr

**ΠΡΟΣΟΧΗ.** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (στο αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επαναληπτική έκθεση.

**Δηλώσεις Προφύλαξης:** Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδύνατο, φυλάσσετε/κλειδώστε. Διάθεση του περιεχομένου/παρατίθετε σε συγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης.

**Πιθανές θύλακες ή θύλακες παρενέργειας, κίνδυνος πρώτων θύλακων και έκτακτα μέτρα προστασίας που περιβάλλονται:** Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν μιλύατες και αιμα στα κόπρανα ή στα ούρα. **Αντιόδο:** Βιταμίνη Κ1 που χορηγείται μόνο από ιατρού/κτηνιατρού προσωπικό.

**Σε περίπτωση:** -**Δερματικής έκθεσης:** Πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι. -**Εκθέσεις των οφθαλμών:** Εξπλύνετε τα μάτια με σφραγισμένο υγρό ή νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά. -**Κατάποση:** Εξπλύνετε προσεκτικά το στομάχι με νερό. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείτε τον περιεχτή του προϊόντος ή την ετικέτα.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 210 7793777

- Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδια ζώα. - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επιστημονούνται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "μην μετακινείτε ή ανοίγετε", "περιέχει τρωκτικοκτόνο", "όνομα προϊόντος ή αριθμός οδούς", "δραστηριότητα (ε-ε) ουσία(ε-ε)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το κέντρο δηλητηρίασεων". Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (συνέχεια):** Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, ο έλεγχος των τρωκτικών επιτυγχάνεται μέσα σε 35 ημέρες. Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. ετικέτα και φακέλακια) πρέπει ειλικρινά να υποδεικνύουν ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (π.χ. παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών) ο χρήστης πρέπει να αναζητήσει συμβουλή από τον παρασκευαστή του προϊόντος ή να καλέσει μια υπηρεσία ελέγχου τρωκτικών. Αναζητείστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον κάθε φορά που ελεγχτείτε τους δολωματικούς σταθμούς. Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

**Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του:** Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει αναβεί από τα τρωκτικά και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

**Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης:** Φυλάξτε το σε έρσο, δροσερό και καλά αεραζόμενο χώρο. Διαπρίψτε τον περιεχτή κλειστό και μακριά από το φως ηλιακό φως. Φυλάξτε το σε χώρους μακριά από την πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής. Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

**Άλλες πληροφορίες:** Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρησιμοποιούνται γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε. Αυτό το προϊόν περιέχει μια μικροκρυσταλλική ουσία και μια χρωστική.

**Καθαρό βάρος (Net weight): 150 GRAM. (g) (περιέχει δολωμάτα/φακέλακια των 15 γραμμαρίων)**

A - fascia B - retro 1 C - fronte D - retro 2 E - fianchi P - pinna