

GOLBEX 80WG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Δισυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση. Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σποριών του μύκητα και ταυτόχρονα ενισχύει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Καλλιέργειες-Στάχος-Δόσεις-Χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέϊπ-φρουτ, Φράπα, Κίτρο, Περγαμόντο, Νεραντζιά): Δόση 300 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού 110-200 λίτρα/στρ. Για Φυτόσφθορα πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης (Απρίλιο-Μάιο),δεύτερος ψεκασμός τον Ιούλιο-Αύγουστο και τρίτος τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 30 ημέρες.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα): Δόση 300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα/στρ. Για Φυτόσφθορα λαμού και ριζών πρώτος ψεκασμός την άνοιξη (Απρίλιο-Μάιο), δεύτερος ψεκασμός τον Ιούνιο-Ιούλιο και τρίτος τον Οκτώβριο κατά τον λήθαργο. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 30 ημέρες. Για Βακτηρίωση ψεκασμοί από την πτώση των πετάλων έως το στάδιο των μικρών καρπών. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 30 ημέρες.

ΑΜΠΕΛΙ (οινοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια): Δόση 250 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο ψεκασμοί που ξεκινούν από την αρχή της βλάστησης. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΦΡΑΟΥΛΑ αγρού και Θερμοκηπίου: Δόση 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Για Φυτόσφθορα λαμού και ριζών προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 8-10 ημέρες ή εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση με όγκο ψεκ. υγρού 10 λίτρα/στρ. Μία εφαρμογή ανά καλ. περίοδο.

ΤΟΜΑΤΑ αγρού και Θερμοκηπίου: Δόση 250 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 30-100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων. Μέχρι 4 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΑΓΓΟΥΡΙ αγρού και Θερμοκηπίου: Δόση 250 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 30-100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων. Μέχρι 4 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΚΟΛΟΚΥΘΙ/ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ αγρού και Θερμοκηπίου: Δόση 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 8-10 ημέρες για Κολοκύθη/ Κολοκυθάκι και μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 8-10 ημέρες για Πεπόνι, Καρπούζι και Κολοκύθα.

ΜΑΡΟΥΛΙ αγρού και Θερμοκηπίου: Δόση 250 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 30-100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων. Μέχρι 4 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ* αγρού και Θερμοκηπίου: Για Φυτόσφθορα προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος με δόση 250γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και όγκο ψεκ. υγρού 250-300 λίτρα/στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 30 ημέρες ή Ριζόπτιση με δόση 5-10 γρ./τετ. μέτρο. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 30 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προετοιμασιών. *Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκύθη/ Κολοκυθάκι, Πεπόνι,Καρπούζι, Κολοκύθα: 3 ημέρες, Μηλοειδή, Μαρούλι: 15 ημέρες, Αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζιο): 28 ημέρες, Εσπεριδοειδή, Φράουλα (ψεκασμός φυλλώματος): 14 ημέρες, Φράουλα (εμβάπτιση ριζώματος), Καλλωπιστικά: Δεν ορίζεται (καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής).

GOLBEX 80WG

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ: -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν : 30 ημέρες -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα : Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστάμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο μετά τον ψεκασμό. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να έχουν απομακρυνθεί. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίαμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Συνδυαστικότητα: Δε συνιστάται η ανάμειξη του σκευάσματος με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι. Το προϊόν δε συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα αζώτου.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Βλέπε επί της συσκευασίας

207

GOLBEX

80WG

Βρέξιμο κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Fosetyl-Al : 80% β/β, Βοηθητικές ουσίες : 17,53% β/β

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΥΑΑΤ): 60891/01.10.2019

Δισυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Περιέχει 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

**Καθαρό βάρος:
1 κιλό**

Κάτοχος της άδειας-Παρασκευαστής σκευάσματος:
EXCLUSIVAS SARBIA S.A.,
Cami de l'Albi – Pta. Rec Nou s/n, Arleto,
Correas No 9, 25110 Alpicat,
Lleida, SPAIN (Ισπανία).

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ANORTKAXHM A.E., Μαρπούζι 9,
10674 Αθήνα. (Τηλ: 2107236700)

Αποκλειστική διάθεση:



1*Χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002, Παιανία
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

GOLBEX 80WG

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την ανάμιξη/φόρτωση και μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι και γάντια. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπασε το σκεύασμα. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210793777**