



ProGibb® 40 SG



**Εγγυημένη ποιότητα
στο Γιββερελλικό**

ΠΡΟΪΟΝ



SUMITOMO CHEMICAL
AGRO EUROPE S.A.S.



κελλαφαρμ A.E.

Το **ProGibb 40 SG** (γιββερελικό οξύ 40% β/β) είναι **Φυτορρυθμιστική ουσία** (ρυθμιστής ανάπτυξης), η οποία επηρεάζει την ποσότητα, την ποιότητα και το χρόνο συγκομιδής ανάλογα με την καλλιέργεια. Διεγείρει τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων.

ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
	Γραμ. ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού	Όγκος ψεκαστικού υγρού. Λίτρα ανά στρέμμα	Γραμ. ανά στρέμμα (μέγιστο)		
Αγκινάρα					
Για την πρόβλεψη της συγκομιδής και την αύξηση της απόδοσης	5	50	2,5	Εφαρμογή όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια των ανθέων. BBCH 41-43	1-2 (14-21 ημέρες)
Σταφύλια (επιτραπέζια σταφύλια - Σουλτανίνα)					
Για τη βελτίωση της ποιότητας των ραγών και της απόδοσης μέσω επιμήκυνσης του τσαμπιού, λέπτυνσης και αλλαγής μεγέθους των ραγών.	7,5	100-200	7,5-15	Για τη Σουλτανίνα εφαρμόστε όταν το μήκος του στελέχους είναι περίπου 4-10 εκατ. μέχρι το 75% των ραγών να είναι 3-6 χιλιοστά. Συστήνονται συνολικά πέντε επεμβάσεις για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του πλήρους μεγέθους των ραγών.	5 (2 ημέρες)
Σταφύλια (οινοποιήσιμα)					
Για τη μείωση των μικρών διαστάσεων του τσαμπιού, τη βελτίωση του αερισμού και την ενίσχυση της αντιμετώπισης των ασθενειών και των παρασίτων και κατά συνέπεια της ποιότητας του κρασιού	5	50	2,5	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη ζώνη των τσαμπιών. Εφαρμογή στο 30-50% πεσμένων ανθέων. BBCH 63-65	1
Εσπεριδοειδή, Λεμόνια, Πορτοκάλια (εκτός Valencia), Μανταρίνια, Γκρειπ Φρουτ					
Για τη βελτίωση της καρπώσεως	2,5	80-200	2-5	Εφαρμογή από την πτώση των πετάλων μέχρι το ξεκίνημα της πτώσης των καρπών. BBCH 67 και BBCH 71	2 (7 ημέρες)
Για τη βελτίωση της ποιότητας του φλοιού του καρπού και την βελτίωση της συγκομιδής	2,5-5	80-300	2-15	Εφαρμογή όταν οι καρποί ξεκινούν να αλλάζουν χρώμα. BBCH 81	1
Αχλαδιά					
Για τη βελτίωση της καρπώσεως, του βάρους των καρπών και της απόδοσης	1,25-2,5	80-100	1,25 - 2,5	Εφαρμογή στο 30-50% της πλήρους άνθησης στην περίπτωση μη παγετού. BBCH 63-65. Σε περίπτωση παγετού, εφαρμογή κατά την περίοδο της άνθησης (BBCH 57-69) και όχι αργότερα από 48 ώρες μετά τον παγετό. Εφαρμόστε ξανά σε περίπτωση περαιτέρω περιστατικών παγετού. Εφαρμογή της υψηλής δόσης όταν η φυσική καρπώση είναι χαμηλή.	1-3 (2 ημέρες)
Κεράσια					
Για τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και της απόδοσης	5	100	5	Εφαρμογή όταν οι πρώτοι καρποί αλλάζουν χρώμα από πράσινο σε ανοικτό κίτρινο (χρώμα άχυρου) BBCH 81	1

Παρατηρήσεις: Χρόνοι εφαρμογών για άσπερμα επιτραπέζια σταφύλια: Πέντε εφαρμογές. Οι εφαρμογές ξεκινούν όταν ο κεντρικός βλαστός της ταξιανθίας έχει μήκος 4-10 εκατ. (BBCH 55-57), δεύτερη εφαρμογή στο 50% ανοικτών ανθέων (BBCH 65), τρίτη εφαρμογή στο 80% των ανοικτών ανθέων (BBCH 68), τέταρτη εφαρμογή στο 50% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH 73-75) και πέμπτη εφαρμογή στο 75% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH 73-75). Οι τρεις πρώτοι ψεκασμοί γίνονται στα 100 λίτρα/στρέμμα και οι τρεις τελευταίοι ψεκασμοί στα 200 λίτρα/στρέμμα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν απαιτείται

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Α.Α.Δ.Α: 8245 (ΥΠ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. 2454 / 28420 / 07-03-2016)