

# FOSALUM

## 80WG

**ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ  
ΚΟΚΚΟΙ (WG)**

**Εγγυημένη σύνθεση:** Fosetyl-Al (φοσετύλ-αλ) 80 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες 16,67% β/β

**ΑΑΔΑ:** 60440/11-2-2015

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.  
Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας  
τη βλάστηση των σπορίων αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:** Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέϊπ –φρουτ, Κίτρο, Περγαμόντο, Νεραντζιά): για Φυτόφθορα (*Phytophthora spp*) με 250 -450 γρ. /στρ. (250-300 γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού) και όγκο ψεκασ. υγρού 100-150 λίτρα/ στρέμμα. Πρώτος ψεκασμός την Άνοιξη, στην αρχή της άνθησης, δεύτερος ψεκασμός Ιούλιο και τρίτος Οκτώβρη-Νοέμβρη.

**Μηλιά, Αχλαδιά:** για Φυτόφθορα λαϊμού και ριζών (*Phytophthora spp*) με 200-360 γρ. /στρ. (250-300 γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού και όγκο ψεκασ. υγρού 80-120 λίτρα/ στρέμμα). Ο πρώτος ψεκασμός τον Απρίλιο, ο δεύτερος τον Ιούλιο και τρίτος Σεπτέμβρη-Οκτώβρη.

**Αμπέλι (οινοποίηση):** Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*) με 75-330 γρ. /στρ. (250-300 γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού και όγκο ψεκασ. υγρού 30-110 λίτρα/ στρέμμα). Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Συνιστάται ο συνδυασμός του με μυκητοκτόνα επαφής (με δ.ο. mancozeb, folpret) για να επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά στους ψεκασμούς μετά την άνθηση ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

**Παρατηρήσεις: 1)** Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των γεωργικών προειδοποιήσεων. **2)** Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Εσπεριδοειδή 3, Μηλιά, Αχλαδιά 3, Αμπέλι (οινοποίηση) 4

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Συνδυαστικότητα:** Συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν mancozeb. Δεν συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα και με διαφυλλικά λιπάσματα που περιέχουν Άζωτο. Σε περίπτωση που προηγηθεί εφαρμογή με παραφινικό λάδι, να εφαρμοστεί το FOSALUM 80 WG αφού περάσει μια εβδομάδα από την εφαρμογή.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Εσπεριδοειδή 15 ημέρες, Μηλιά, Αχλαδιά 28 ημέρες, Αμπέλι (οινοποίηση) 28 ημέρες. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**Καθαρό βάρος: 2,5 ΚΙΛΑ**

**Προφυλάξεις:** - Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν - Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές - Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση - Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».**

**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση κατάποσης** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής** μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777**

**Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις**

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:**  
Βλέπε επί της συσκευασίας

Κάτοχος της άδειας:  
**CHEMINOVA AGRO SA**  
Paseo De La Castellana 257,  
5o -28046, Madrid, Spain

Υπεύθυνος για την τελική  
διάθεση στην αγορά:

 **HELLAFARM** Α.Ε.

**ΑΘΗΝΑ:**  
Φλέμυγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900  
www.hellafarm.gr, info@hellafarm.gr