

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ.**

Προκαλεί σοβαρή οικολογική βλάβη.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
Περιέχει copper sulphate

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές. Μην τράτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Προστατέψτε τα μάτια/πρόσωπο. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα και κρατήστε τον σε αναπαυτική θέση και ζεστό. Για δύσκολες περιπτώσεις, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε σχολαστικά για μερικά λεπτά. Απομακρύνετε τυχόν φακούς επαφής, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Συμβουλεύτετε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα με νερό, χορηγίστε μεγάλη ποσότητα νερού και ζητήστε ιατρική συμβούλη. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

Συνδυαστικότητα: Να αποφεύγεται η ανάμιξη με σκευάσματα που περιέχουν χαλκό ή καστερό επειδή μπορεί να προκαλέσει φυτοποικότητα. Συνδυάζεται με λιπάσματα και φυτοφάρμακα ωστόσο πριν την ανάμιξη του προτείνεται μικρή δοσική συνδυαστικότητας.

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό χώρο. Διατηρήστε το μακριά από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του προϊόντος από τους Γεωπόνους της Εταιρείας και το ειδικό φυλλάδιο που διαθέτουμε.

Σημείωση: Η Εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. εγγυάται την ελεγμένη σύνθεση του προϊόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα της χρήσης αυτού, άσχετα αν αυτή έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως ή όχι για τυχόν ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, που οφείλονται στην αποθήκευση ή χρησιμοποίηση του προϊόντος. Κάθε αγορά θεωρείται ότι είναι σύμφωνη με τους ανωτέρω όρους.

**ALBION®
PLANT NUTRITION**

METAΛΟΖΕΪΤ

Minerals • Science • Chelates™

ΧΑΛΚΟΥ

Cu

Σύνθεση: Χαλκός 4%
Χηλική μορφή με αμινοξέα
Λίπασμα νέου τύπου-ομάδα στο Ποσοστό υδρολυμένης φυτικής πρωτεΐνης/συνολική: 100%

Αρ. Άδειας κυκλοφορίας: 53

Χηλικές ενώσεις αμινοξέων με μέταλλα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προϊόν Η.Π.Α. Της: ALBION

Αποκλειστική διανομή -
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

χελλαφαρμ A.E.

1ο χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002, Παιανία
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το χηλικό **ΜΕΤΑΛΟΖΕΪΤ ΧΑΛΚΟΥ** προορίζεται για πρόληψη και θεραπεία ανωμαλιών στη θρέψη των φυτών, που προέρχονται από έλλειψη ή ανισορροπία διαφόρων ιχνοστοιχείων και που εμφανίζονται με μορφή τροφοπενίων, μείωση παραγωγής και ποιότητας κ.λτ.

Χρησιμοποιείται με ψεκασμό επί του φυλλώματος των φυτών. Είναι προϊόν υδατοδιαλυτό και μη τοξικό για τα φυτά και τους καρπούς όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Χρησιμοποιείται σε Σιτρά, Φασόλια, Αραβόσιτα, Βαμβάκι, Φιστίκια, Πατάτες, Ρύζι, Ζαχαρόπευτλα, Τομάτες, Καπνό, Μηδική, Κηπευτικά, Εσπεριδοειδή, Οπωροφόρα δένδρα και άλλες καλλιέργειες (βλέπε οδηγίες χρήσης)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η δοσολογία καθορίζεται από το είδος της καλλιέργειας, το στάδιο ανάπτυξης και τη σοβαρότητα της τροφοπενίας. Οι μέγιστες δόσεις συνιστώνται για φυτά πλήρους ανάπτυξης. Για εφαρμογή σε μικρότερα φυτά πρέπει να μειωθεί ανάλογα η δοσολογία.

-Φυτά μεγάλης καλ/γειας, λαχανικά, κηπευτικά, πατάτα. Δόση 30-60 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή κατά την περίοδο ταχείας ανάπτυξης ή έντονων θρεπτικών αναγκών. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί δύο ή περισσότερες φορές ανά καλλιέργητη περίοδο.

-Καρποφόρα δένδρα: Δόση 60-120 κ.εκ./στρ. Έναρξη των εφαρμογών στην αρχή της ανάπτυξης. Οι εφαρμογές μπορούν να επαναλαμβάνονται καθ' όλη την καλ/κή περίοδο με μεσοδιάστημα 2-4 εβδομάδων.

-Αμπέλια και μικροί καρποί (μούρα): Δόση 40-90 κ.εκ./στρ. Έναρξη των εφαρμογών στην αρχή της ανάπτυξης. Οι εφαρμογές μπορεύνε να επαναληφθούν καθ' όλη την περίοδο αύξησης με μεσοδιάστημα 1 ή περισσότερες εβδομάδων.

Παρατρήσεις:

-Στα πυρηνόκαρπα να εφαρμόζεται μόνο κατά το διάστημα από την καρπόδεση ωστόσο η διάμετρος του καρπού φθάσει τα 2,5εκ. Διαλύνεται ένα μέρος του προϊόντος σε 20 ή περισσότερα μέρη νερού. Να μην εφαρμόζεται αδάλυτο.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλη ψεκαστική συσκευή και όγκο ώστε να επιτευχθεί πλήρης κάλυψη των φυτών.

Σε φυτά στα οποία είναι δύσκολη η διαβροχή του φυλλώματος (π.χ. κηραϊδή φύλλα) συνιστάται η χρήση μη ιονικού διαβρεκτικού παράγοντα.

Αρ. παρτίδας/Ημ. παραγωγής: βλέπε επί της φιάλης

Περιεχόμενο: 1 Λίτρο