

**Δημόσια Προφύλαξη:** Φωλαίδης είναι κλειστόνεμο, μακριά από πατίδα. Μην τρέτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πρώιμο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και σιουσάις προστασίας ματιών. Να φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακριά παντελόνια και γάντια κατά τη ανάβασή/ψύρωση και κατά τη εργασία! Σε περίπτωση επανεισόδου θα το φεύγασμό οργάνως πρέπει να φοράνε προστατευτική ενδυμασία (μακρυμάνικο πουκάμισο και μακριά παντελόνια). Διασφάλιση περιχορεύσεων / περιεκτική ομώνυμα με την έθνικη νοσοφρέδη. Η πα παρθένετε υπό τους κίνδυνους για την ανθεμύθηση υειδα και το περβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες Βοηθοί - Αντίδοτο:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΥΓΑΣ Ή ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν προβολές προπαίας, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι έωσιμο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν ο ερεθίσμος επινέψει: Συμβούλευτεστε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΡΡΟΣΗΣ: Ζητείστε ιστορική συμβούλευση και δείξτε αυτό το δοχείο ή τη επικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΥΓΩΝ: Μετακινείστε τον ποδάρη σε κοιδερό αέρα. Συμβούλευτεστε γιατρό μετά από οδηγήση έκσοσης. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΥΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΡΜΑ: Ξεπλύνετε αμέσως, με άθροιστο νερό και ασπασίων. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπαραγκωνική θεραπεία.

**Τηλεφόνο Κέντρου Δημητριάδησσων: 210793777**

**50 γραμ.**

**ZIZANIOKTONO**

# PLAZA

25WG

Εκλεκτικό μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστώδων και πλατύψυλων ζιζανίων σε αράβοτο, τομάτα και πατάτα.

ΠΡΟΩΡΙΦΟΡΙΕΣ για τη φύση των ειδικών κινδύνων και τις πρώτες βοηθείες αναγράφονται στην επικέτα επί της φιάλης

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  

  
info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

**ΒΡΕΣΙΜΟ ΚΟΚΚΟΙ (WG)**  
 Εγγυημένη σύνθεση: δραστική ουσία: rimsulfuron 25% β/β  
 Βοηθητικές ουσίες: 74,2% β/β  
 ΑΔΑΔ: 70391/30.04.2020

**Κάτοχος της έγκρισης:** ASCENZA AGRO S.A.  
 Alameda dos Oceanos Lote 1.06.1-32 A  
 Parque das Nações 1990-207 Lisboa, Portugal

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:** Για την καταπολέμηση αγρωστώδων και πλατύψυλων ζιζανίων στις ακόλουθες καλλιέργειες:

**Τομάτα από σπόρο ή μεταφυτεύομενη:** Μία εφαρμογή μεταφυτωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 3-8 φύλλων με δόση 6 γρ./στρ. ή δύο εφαρμογές: η 1η εφαρμογή στα πρώτα της καλλιέργειας με δόση 6 γρ./στρ. και η 2η εφαρμογή, 8-15 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή έως το στάδιο των 8 φύλλων της καλλιέργειας BBCH 13-18 με δόση 5 γρ./στρ. (βλ. παρατήρηση 4)

**Πατάτα:** Μία εφαρμογή μεταφυτωτικά όταν η καλλιέργεια έχει ύψος 10-20 εκ. και μέχρι να καλύψει τη γραμμή με δόση 6 γρ./στρ. ή δύο εφαρμογές: η 1η εφαρμογή όταν η καλλιέργεια έχει ύψος 10 εκ. με δόση 6 γρ./στρ. και η 2η εφαρμογή, 8-15 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή BBCH 20-30 με δόση 3 γρ./στρ. (βλ. παρατήρηση 4)

**Αραβόσιτος:** Μία εφαρμογή νωρίς μεταφυτωτικά όταν ο αραβόσιτος βρίσκεται στο στάδιο των 2-4 φύλλων με δόση 5 γρ./στρ. ή σπαστή εφαρμογή: 1η εφαρμογή από το στάδιο των 2 φύλλων της καλλιέργειας με δόση 3 γρ./στρ. και η 2η εφαρμογή, 8-15 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή έως το στάδιο των 4 φύλλων BBCH 12-14 με δόση 2 γρ./στρ. Ογκός ψεκ. υγρού: 20-40 λίτρα / στρ.

**Παρατηρήσεις:** 1. Τα αποτελέσματα είναι καλλιέργεια όταν τα περισσότερα ζιζάνια έχουν ψυρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο και σε ζυμρή ανάπτυξη. 2. Συνιστάται η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού ΡΟΤΤΟΚ σε δόση 20 κ.εκ./στρ. για την αποτελεσματικότερη δράση του ζιζανιοκτόνου. 3. Η μεγάλη δόση συνιστάται όταν υπάρχει μεγάλη προσβολή κυρίως αγρωστώδων ζιζανίων (στον αράβοσιτο). 4. Συνιστάται δευτέρη εφαρμογή όταν υπάρχει επαναπροσβολή από Αγριοτομάτια (Αντράκια (τομάτα/πατάτα). 5. Σε μεταφυτεύομενη τομάτα, ο ωκεανός να πραγματοποιείται αφού η καλλιέργεια έχει ξεπεράσει το μεταφυτευτικό σοκ. 6. Να αποφεύγεται στη διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες.

**Πρότοις δράσης:** Εκλεκτικό μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστώδων και πλατύψυλων ζιζανίων σε αράβοτο, τομάτα και πατάτα. Απορροφάται από το φύλλωμα και από τις ρίζες των ζιζανίων. Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων προκαλώντας την νέκρωση τους.

**212**

**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτετε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δύοχειο αναδέυοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστάται να εφαρμόζεται αρέσως και υπό συνεχή ανάδευση κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστή:** Αρέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστή και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Επιλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό (0,5 λίτρο οικιακής αμμιωνίας 6%/100 λίτρα νερό) και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθόρο νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόδυνη του ψεκαστικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας (φιάλες) ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνο με διαιροεπικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικήτης των ζιζανίων. Το σκεύασμα περιέχει rimsulfuron (σουλφουνούρια), ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα B κατά HRAC.

**Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος, με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, πίεση 2-3 atm και μπεκτύπου σκούπας.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, ψυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή/να αποκλείστε:** Να μην εφαρμόζεται: -όπως ψυστεί, -εάν αναμένεται βροχή εντός 3 ωρών. -σε καλλιέργειες που υποφέρουν από προσβολές εντόμων ή ασθενιών, έρασισια, χαμηλές θερμοκρασίες, κ.λπ. -σε περίπτωση θερμοκρασιών κάτω των 10-12°C ή πάνω των 25-26°-σε ποικιλες γλυκού καλαμποκιού. -σε καλλιέργεια καλαμποκιού ή πατάτας που προσρίζεται για σποροπαραγωγή.

**Διαχείριση Ανθεκτικότητας:** Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνο με διαιροεπικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικήτης των ζιζανίων. Το σκεύασμα περιέχει rimsulfuron (σουλφουνούρια), ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα B κατά HRAC.

**Συνδυαστικότητα:** Συνδυάζεται με μη ιονιζόμενο επιφανειοδραστικό σκεύασμα (ΡΟΤΤΟΚ).

**Στοιχεία ψυτοδικότητας, ευαισθάνεσης ποικιλών και κάθε άλλης παρενέργειας στη φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν παρουσιάζει ψυτοδικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα ψυτοδικότητας (χλώρωσης), που δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη ή την απόδοση των καλλιέργειων.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από αράβοσιτο, πατάτα, τομάτα ή τομάτα πριν περάσουν 90 ημέρες από την εφαρμογή.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιέργειων που αικολουθούν:** Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από αράβοσιτο, πατάτα, τομάτα πριν περάσουν 90 ημέρες από την εφαρμογή.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Τομάτα, πατάτα, αράβοσιτο: Μη εφαρμόσιμο. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκεύασματος (νωρίς μεταφυτωτικά).

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκεύασματος:** Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία < 45°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Για να προστατεύετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία φυτική ζώη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά υδάτα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αιγάλεωση στην ζώη προστασίας από την μη γεωργική γη: 5 μέτρων, σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.