

+280. mm

PAGE 1

+50. mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Κρατάτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και κατάλληλη μάσκα κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή, καθαράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια σε περίπτωση επενεσίωσης στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό». Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο:** **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο σαπουνί και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν παρατηρηθεί οφθαλμικός ερεθισμός συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Απομακρύνετε τον παθόντα από την πηγή έκθεσης. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν χρειαστεί. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΙΗΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και (ζητήστε ιατρική συμβουλή αν χρειαστεί). **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΙΩΝ: 210 77 93 777**



Romeo

Βρέξιμη σκόνη (WP) Καθαρό βάρος: **250 γραμμάρια**

Εγγυημένη Σύθεση: cetevisanpe (κυτταρικά τοιχώματα του *Saccharomyces cerevisiae strain LAS 117*); 94,1 % (β/β) (σε καθαρή ουσία) ή 100 % (σε τεχνικά καθαρή ουσία)

ΑΑΔΑ: 11112 / 1.4.2020

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

UFI number : 865-00EX-R003-PVFT

Hu/ για παραγωγή, Hu/ΑΠΕΣ, Αρ Παρτίδας ΒΑ, επί της συσκευασίας

239



κελλαφορμ

1^η κλπ. Α.Παιανίας, Μαρκοπούλου, Τ.Θ.10019002, Παιανία, Σ210 6802900 info@kellafarm.gr, www.kellafarm.gr

Ανοίξτε εδώ για συνημμένες οδηγίες

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποικειαστεί: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, δεν αναμένεται κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας λόγω του τρόπου δράσης του προϊόντος (ενεργοποιητής, που μηχανισμικό άμυνας των φυτών). Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία cetevisanpe, έναν ενεργοποιητή των μηχανισμών άμυνας των φυτών στους μύκητες που ανήκει στην ομάδα R6 κατά HRAC.

VARNISH GLOSS



PAGE 2


ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Ενισχύει την αντίσταση του φυτού ενάντια στις ακόλουθες ασθένειες

Αμπέλι (επιτραπέζιες και ονοσοποιήσιμες ποικιλίες): 25 γρ./στρ για περονόσπορο, αιδίο, βοτρυτή, **Ελιά*:** 25 γρ./στρ για γλοιοσπόριο* **Αμυγδαλιά*:** 50 γρ./στρ για μονίλια και γλοιοσπόριο **Κερασιά*:** 50-75 γρ./στρ για μονίλια και βοτρυτή **Μηλιά*:** 50 γρ./στρ για αλτερνάρια, σεπτόρια, σκωρίαση **Καρυδιά*:** 75 γρ./στρ για ανθρώπινη **Φιστίκι*:** 50-75 γρ./στρ για αιδίο **Φράουλα, Βυσανιά* , Δαμασκηλιά* , Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) (Υ+Θ)*:** 75 γρ./στρ για βοτρυτή, **Τομάτα(Υ+Θ), Κολοκύθι(Υ+Θ)*, Μελιτζάνα(Υ+Θ)*, Ακτινιδιά*:** 50 γρ./στρ για βοτρυτή, **Κρεμμύδι*:** 50-75 γρ./στρ για βοτρυτή και αιδίο **(Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα) (Υ + Θ):** 50 γρ./στρ για αιδίο **(Μαρούλι, Αντίδι*, Ραδικά*, Σταμναγκάθι*, Στέβια*, Μπρόκολο*, Κουνουπίδι*, Σπανάκι*, Ντάλια, Ρόκα*, Αγκινάρα*)(Υ+Θ):** 75 γρ./στρ για Περονόσπορο.

Παρατηρήσεις: 1) Όγκος ψεκ. υγρού: 10-100 λίτρα/στρ. 2) Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο: Αμπέλι 10 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημερών, για τις υπόλ. καλλιέργειες: 8 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7ημερών. 3) Χρόνος εφαρμογής: -Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης [BBCH 59 – 89 (ακτινιδιά). -Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 2ου (πραγματικού) φύλλου μέχρι α) στα μέρα πριν τη συγκομιδή BBCH 12 – 89 (μαρούλι, αντίδι, ραδικά, σταμναγκάθι, στέβια, σπανάκι, ρόκα, αγκινάρα) β) το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης [BBCH 12 – 90 (καρυδιά), BBCH 12 – 91 (κρεμμύδι, κάλλιψη, φυτά), BBCH 12 – 89 (Αμπέλι –ωρίμανσης των ραγών), BBCH 12 – 89 (υπόλ. καλλιέργειες)]. 4) Εφαρμόζεται προληπτικά, σε εναλλαγή ή σε συνδυασμό με κατάλληλα μυκητοκτόνα ανάλογα με την πίεση των ασθενειών. Να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις χαμηλής ή μέτριας προπόβλης. 5) Για τη βέλτιστη ενεργοποίηση της άμυνας των φυτών, συνιστώνται διαδοχικές εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. 6)Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος είναι μέτρια και διαφοροποιείται ανάλογα με το παθογόνο. 7)Η αποτελεσματικότητα του ROMEO ως προς την καταπολέμηση του αιδίου της αμπέλου βελτιώνεται σε ανάνεμη με τα μικροτοκτόνα Polygram WG, Aviso Mono WG, Orkadia WG, Capsys WG, Arlesto WG, Thionit 80WG, Kocide Opti 30WG στο μισό της εγκεκριμένης δόσης τους. 8)*Χρήση Ήσσωνος Σημασίας, «δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες: Βυσανιά, Δαμασκηλιά, σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα), κολοκύθι, μελιτζάνα, αντίδι, ραδικά, σταμναγκάθι, στέβια, μπρόκολο, κουνουπίδι, σπανάκι, ντάλια, ρόκα, αγκινάρα, ελιά (γλοιοσπόριο), αμυγδαλιά, κερασιά, ακτινιδιά (βοτρυτή), μηλιά (αλτερνάρια, σεπτόρια, σκωρίαση), καρυδιά, κρεμμύδι (βοτρυτή), καλλισπαστικά φυτά, φυσιτικά, από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

7mm

GLUELESS



PAGE 3

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα Polygram WG, Aviso Mono WG, Orkadia WG, Capsys WG, Arlesto WG, Thionit 80WG, Kocide Opti 30WG.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε λίγο νερό μέχρι να σχηματιστεί ομοιόμορφο εναύηρημα. Προσθέστε το εναύηρημα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής. Το σκεύασμα να προστίθεται πρώτα στα βυτία, σε περίπτωση ανμίειξης με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα Polygram WG, Aviso Mono WG, Orkadia WG, Capsys WG, Arlesto WG, Thionit 80WG, Kocide Opti 30WG. Εφαρμόζεται κατά προτίμηση χωρίς το πρωί. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος σε υψηλές θερμοκρασίες. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο αμέσως μετά τον ψεκασμό. Πλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του προϊόντος. **Τρόπος εφαρμογής:** ψεκασμός φυλλώματος με καλή κάλυψη των δύο επιφανειών των φύλλων.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι κενές συσκευασίες (δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρίψιμο ή οκίσιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις αντιστοιχόμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:** Όλες οι καλλιέργειες: 1 ημέρα. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του καλά ερμητικά κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Αποφύγετε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C και πάνω των 35 °C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

7mm

RELEASE VARNISH

