

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διατηρείστε τη συσκευασία ερμητικά κλεισμένη σε δροσερό μέρος.
 - Η συσκευασία να προστατεύεται από την υγρασία.
 - Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές.
 - Μακριά από ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες.
 - Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
 - Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
 - Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
 - Φοράτε κατάλληλα γάντια.
 - Σε περίπτωση πυρκαγιάς και /ή εκρήξεως, μην αναπνέετε τους καπνούς.
 - Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε ξηρά χημικά, διοξειδίο του άνθρακα, αφρό, αλογονομένο αέριο.
 - Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος, πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.
 - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.
- " Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης."**
- Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**
- Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το σκεύασμα ή την ετικέτα.
 - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή αν παρουσιαστεί ερεθισμός τους.
 - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυνθείτε με νερό και σαπούνι.
- Αντίδοτο:** Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

06/11

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ, ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά. Μη ρυπαίνετε με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του ποτάμια, αρδευτικούς ή υδροφόρους αγωγούς.
Να μην εφαρμόζεται κοντά σε υδροβιότοπους.

Διατίθεται μόνο από ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε θερμοκρασία δωματίου παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

BRODIFACOUM ΖΑΡΙ 0.005 AB

BRODIFACOUM (ΜΠΡΟΝΤΙΦΑΚΟΥΜ) 0.005 %
Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους δημητριακών (AB)

Εγγυημένη σύνθεση: Brodifacoum 0.005 % β/β **Αριθμ. Εγκρ. Κυκλοφορίας:**
Βοηθητικές ουσίες: 99.995% β/β 4105/24-01-2007
Περιέχει πικραντικό παράγοντα

ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Επιτρέπεται η πώληση του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων



**Καθαρό βάρος:
5 Κιλά**

Κάτοχος έγκρισης-Παρασκευαστής σκευάσματος
Εργοστάσιο παρασκευής & συσκευασίας
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA, Italy www.zapi.it
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ANOPΓKAXHM A.E.,
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,
Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι,
Τηλ. 210 68 00 900, e-mail: info@hellafarm.gr

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ & ΔΟΣΕΙΣ

Πεδίο εφαρμογής-Δόσεις:

Το **Brodifacoum-Zari 0.005 AB** χρησιμοποιείται:

- α) Για την καταπολέμηση των ποντικών (*Mus musculus*) και των αρουραίων (*Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*) μέσα και γύρω από τα κτίρια (σπίτια, αποθηκευτικοί χώροι, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις). Δόση 25-50 γρ. ανά θέση δολώσεως. Σε περίπτωση των καστανών αρουραίων (*Rattus norvegicus*) ή όπου οι προσβολές είναι βαριές αυξήστε ανάλογα τα σημεία δολώσεως.
- β) Στην ύπαιθρο για την καταπολέμηση των τρωκτικών:
 - β1) Σε εφαρμογές περιορισμένης κλίμακας, δηλαδή μικρές εκτάσεις ή μικρή προσβολή
 - β2) Σε εφαρμογές ευρείας κλίμακας, δηλαδή σε περίπτωση εξάρσης πληθυσμών ή σε μεγάλη έκταση όπως πχ αρουραίοπληκτες κατοικημένες περιοχές, όπου πρέπει να γίνεται με ευθύνη και επίβλεψη ειδικού επιστήμονα (γεωπόνου). Δόση 300-2500 γρ/ στρέμμα ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Πριν την καταπολέμηση καθαρίστε το χώρο από τις τροφές που έβρισκαν οι ποντικοί. Ο αριθμός των θέσεων δολώσεως εξαρτάται από τη σοβαρότητα της προσβολής. Τοποθετούμε φορώντας γάντια την απαιτούμενη δόση δόλωσης στα σημεία από όπου ζουν, διέρχονται και τρέφονται τα τρωκτικά. Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από τη παρουσία τρωκτικών. Συνήθως ένα μόνο γεύμα με Brodifacoum-Zari 0.005 AB είναι ικανό να αποβεί θανατηφόρο σε μια περίπου βδομάδα. Για μικρές προσβολές μια δόλωση είναι συνήθως επαρκής. Για την καταπολέμηση των ποντικών τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις 2-5 μέτρων επειδή οι ποντικοί τρέφονται ακανόνιστα και εξερευνούν καινούριες τροφές. Η θέση δολώσεως πρέπει να αλλάζει περιοδικά. Για την καταπολέμηση των αρουραίων τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις 5-10 μέτρων, επειδή οι αρουραίοι τρέφονται συνήθως σε προφυλαγμένα μέρη, από τροφές με τις οποίες έχουν εξοικειωθεί. Το δόλωμα πρέπει να αναπληρώνεται μέχρι να σταματήσει να τρώγεται από τα τρωκτικά. Δολώματα που στο τέλος της καταπολέμησης μένουν ανέφαφα πρέπει να συλλέγονται και να καταστρέφονται.

Αρ. παρτίδας-Ημ. παρασκευής-Ημ.λήξης: βλέπε επί της συσκευασίας.

