

ΦΙΛΑΜΕΤ
10/40WP

Βρέχμη σκόνη (WP)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αμπέλια: Για περιονόσπορο εφαρμογούς όπων οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση, λίγο μετά την άνθηση. Για φώμιουν 1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του του φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων. Δόση εφαρμογής: 20 γρ./100 λίτρα ψευδούν. Ογκός ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-150. Μεγ. αριθ. εφαρμ.: ανά καλ. περιόδο: 4.

Παρατήρηση: Μετά την τελευταία εφαρμογή με το σκένασμα συνεχίστε τους ψεκασμούς με μυκητοκόντα επαφής ή διασυστηματικό διαφορετικού τρόπου δράσης (να μην περιέχουν δραστικό συστατικό της ομάδας των φαινοματιδίων, όπως βεναλαχκή και ούρας).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Εμβιζόμαντος το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε τη συσταύμενη δόση σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδένουμε μέσα σε λίγες ώρες.

Συνδιαστικότητα: Συνδύεται με τα περισσότερα γνωστά μυκητοκόντα και εντομοκόντα εκτός από το Thiram και τους πόλτούς. Για νέα δραστικά συστήνεται δοκιμή συνδιαστικότητας σε μικρή κλίμακα. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στην συνιστώμενη δόση σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο μεταξύ της εφαρμογής και της πρόσθιασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί σκένασμα. Κρεπτίστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή δάχτυλα πρόσωπα και οπωδόποτε έγκες γυναικες. Να αποφέυγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάστηκε με ΦΙΛΑΜΕΤ επί 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό. Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Αμπέλι: στο τέλος της άνθησης. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά συσκευασίας (σακούλες, σίκοι) μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περιπέτεια χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνήθισες αποθήκευσης χρονική σταθερότητα του σκενούσματος:** Να αποθήκευται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία και το άμεσο ήλιακό φως και σε θερμοκρασία από -10°C μέχρι +25°C. Στις συνήθισες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

213 Αρ. Παρτίδας-Ημ. Παρασκευή-Ημ. Ηήξης: Βλέπε επί τη συσκευασία

Μεταλαξύλ + Φολπέτ
Εγγ. Σύνθεση: Metalaxyl 10% β/β + Folpet 40% β/β, Βοηθητικές συστέξ 46,92% β/β

ΔΔΕΙΑ ΠΑΡΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
του προϊόντος με αρ. έγκρισης κυκλοφορίας: 6746
Ημερομηνία χορήγησης άδειας παράλληλης εισαγωγής: 23/02/2011 (αρ. πρ. 93316)

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποτοποιούνται πρόσωπα καρκίνου.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: «Φυλάσσεται κλειδωμένη και μακριά από παιδιά.» Μην το χρησιμοποιήστε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. «Μην τρώτε μην πίνετε ή κανίστετε πάντα χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.» Να φοράται προστατευτικά ενδύματα και αντανευστικό εξοπλισμό (FPP3, APR 20). •ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιο μενής έκθεσης: Συμβουλεύεστε/ Επισκευάστε γιατρό, Περιέχει Metalaxyl και Folpet. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ασφάλεια σας γίγνεται και το παρόν διάλογος απολύτως επαρκής για την ασφάλεια σας. Πρώτες βοήθειες: Αντιδροτική αισθητούντες αισθητούντα ή πρώτες αιτητές αιτητές συμβιωσική διάσταση την επικεκτάστηση σε ενιαίο δυνατόν. **Αντίστοιχο:** Σεν υπάρχει ειδικό αντίστοιχο. Εφερμόδαστο συμπληκτική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δημήτρησων: 210 7793777

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:
400γρ.

Παρασκευαστής:
Industrias Químicas Del Vallés SA,
Vallés
Υπεύθυνος κυκλοφορίας
στην Ελλάδα:

1οχ. Λ. Παπαϊωνάς-Μαρκοπούλου, Τ.ο. 100,
19002, Πατανία, Τηλ.: 210.68.00.900
info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr