

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακρί από παιδιά.  
- Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα αποτυπικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Διάθεση του πριεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **«Κινά να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».**

**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:** Εάν ζήτησετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον πρεσβύτερο του προϊόντος ή την επικετά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήθει ερεθισμός του δέρματος: Συμβούλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα μάτια αμέως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και συμβούλευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης, τοποθετείστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε τον από υποθερμία. Ζήτηστε αμέως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την επικετά. Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέως γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με κοθαρό αέρα, κρατήστε την ζεστό και σε ανάπτυξη. Ζήτηστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛΕΦΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ:**  
**2107793777**

**ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε αμέσως ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα και τη μη γεωργική γη. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αμέσως ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Η απόσυρση/ καταστροφή του Nisshin 4 OD, πρέπει να γίνεται σε υψηλό κάρινο που έχει κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευασμάτος. Τα κενά υψηλά συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νέρα του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περιστέρευσης, εναποθετούνται σε σημεία υπόλογης, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνήθιστες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος:** Τα σκευασμάτα παραμένουν σταθερό για 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ηρό, δροσερό και καλή αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασίες έως 20°C. Δεν συνιστάται η αποθήκευσή του σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες.

# ZIZANIOKTONO NISSHIN 4OD

## Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

**Εγγ. σύνθεση:** Nicosulfuron 4 % β/ο  
(χημ.ομάδα πυριμιδινούσουλφονυλουρία)  
Βοηθητικές ουσίες: 95.52% β/β

**Αρ. Άδειας Διάθεσης:** 70035/08.04.2013

**Διασυστηματικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου.**



Κάποχος της άδειας: ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.  
Pegasus Park – De Kleetlaan 12B, Bus 9 Diegem B-1831 Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**Χελλαφαρμ**

1<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Παιανίας - Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100,  
19002 Παιανία, Τηλ: 210 6800 900  
info@hellafarm.gr [www.hellafarm.gr](http://www.hellafarm.gr)

**1 ΛΙΤΡΟ**  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
UFI: A71M-GSN8-W204-KG81

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

**Αραβόσιτος:** Για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων: **Μουγιρίτσα** με δόση 100 κ.εκ./στρ. όταν η καλλιέργεια του αραβοσίτου βρίσκεται στα 1-3 φύλλα και με δόση 100-150 κ.εκ./στρ. όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στα 1-2 αδέλφια. **Σετάριες** με δόση 100 κ.εκ./στρ. όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2-4 φύλλων. **Βέλιουρας** α. από σπόρο με δόση 100 κ.εκ./στρ. μέχρι το στάδιο των 8 φύλλων της καλλιέργειας και β. από ρίζωμα με δόση 125-150 κ.εκ./στρ. όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στα 10-20 εκ. ύψος. **Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων:** **Βλίττα** με δόση 100 κ.εκ./στρ. και για **Τάτουσα** με δόση 100-150 κ.εκ./στρ. όταν η καλλιέργεια του αραβοσίτου βρίσκεται στο στάδιο των 2-4 φύλλων.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-40 λίτρα/ στρέμμα.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργεική περίοδο:** 1

**Παρατηρήσεις:** 1) Οι εφαρμογές γίνονται στα 2-8 φύλλα της καλλιέργειας του αραβοσίτου, 2) Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο, συνιστώνται 2 εφαρμογές σε μεσοδιάτημα 7-14 ημέρες, ως εής: 1η εφαρμογή με δόση 100 κ.εκ/ στρέμμα και 2η εφαρμογή με δόση 50 κ.εκ/ στρέμμα.

**Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φύλλωμάτος και με πίεση μικρότερη από 2,5Atm (40psi) με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μικτό τύπο σκόύπως.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέντος αναδένοντας την συνιστώμενη δόση του σκευασμάτου. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό αναδένοντας συνεχώς.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Ξεπλύνεται καλά τα ψεκαστικά μέσα. Αν δε γίνεται αυτό ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στην οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3% (1 λίτρο ανά εκατόλιτρο) μέχρι ότου απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευασμάτου. Τα στάδια καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής: -Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να πρέπει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε ξανά. -Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στην οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνιακής οικιακής χρήσης 3% ανά 100λίτρο. Κυκλωφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω δόλου του συστήματος «ψεκάζοντας» υπό συνεχή ανάδευση,

μέχρι να αδειάσει. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι αμμωνία) άλλη μια φορά και ακόμη μία φορά χωρίς αμμωνία. - Χρησιμοποιείστε το ίδιο διάλυμα για το ξέπλυμα δύο φορές των φιλτρών και των μπεκ τα οποία ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

**Τρόπος δράσης:** Το nicosulfuron δρά παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθέταση του οξειγαλακτικού.

**Συνδυαστικότητα:** Να μην συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα. Να εφαρμόζεται μόνο του.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτώνεγιας, φυτούγειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες ποτέ σκευάσματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε:** • Να αποφεύγεται η χρήση ολοκλήρου του φυτού του αραβοσίτου ως ζωτοφροφή πριν την ωρίμανση του. • Μην ψεκάζεται σταν φυάδει και ανιθέτε με την φορά του ανέμου • Μην διπλωφεύετε τα άκρα των ζωνών.

**Χρονικό διάστημα ασφαλίας μεταξύ εφαρμογής και:**

**- σπόρος ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το Nissin 4 OD, στον ίδιο αγρό την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρέ μόνο αραβοσίτος.

**- σπόρος ή φύτευσης των καλλιέργειών που αικονουδούν:** Για σπόρα χειμερινού σταριού πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και οποιαδήποτε άλλης καλλιέργειας την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την εφαρμογή του Nissin 4 OD και αφού προηγήστε βαθιά άρση.

**- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευάσμα:** Εισόδος του εργάτη στην καλλιέργεια αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

**Φυτοτοξικότητα:** Το προϊόν να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβοσίτος βρίσκεται υπό stress υγρασίας σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C και κάτω από 10°C. Κατά την 1η - 2η εβδομάδα μετά την εφαρμογή - είναι δύνατον να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης δόσεως, είναι δε παροδικό. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή της αποδόσεις. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκό καλαμπόκι καθώς και σε καλαμπόκι που προσορίζεται για σπαρόρα.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Δεν ορίζεται (καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής).

**ΑΡΑΠΤΙΔΑΣ - ΗΜ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΗΜ.ΛΗΞΗΣ:** Βάλτε επί της συσκευασίας: