

# HEADLAND VERTEX

HI-N™

Λίπασμα

**Διαφυλλικό λίπασμα υψηλής περιεκτικότητας αζώτου  
με μαγνήσιο, χαλκό και μαγγάνιο**

**ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(Β)(Ι): ΑΠΛΟ ΥΓΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ**

N (Mg) λίπασμα 24,5 (+2,6) με χαλκό (Cu) (νιτρικό) και μαγγάνιο (Mn) (νιτρικό).  
Όλα τα θρεπτικά συστατικά είναι πλήρως διαλυτά στο νερό.

Άζωτο (N): 24,5% β/β, 32,8% β/ο

Νιτρικό άζωτο: 7,4% β/β, 9,9% β/ο

Αμμωνιακό άζωτο: 5,1% β/β, 6,8% β/ο

Ουρικό άζωτο: 12,0% β/β, 16,1% β/ο

Οξειδιο μαγνησίου (MgO): 2,6% β/β, 3,5% β/ο

Χαλκός (Cu): 0,37% β/β, 0,5% β/ο

Μαγγάνιο (Mn): 0,66% β/β, 0,89% β/ο

**Συστατικά:** νιτρικό αμμώνιο (CAS no 6484-52-2),

ουρία (CAS no 57-13-6),

νιτρικό μαγνήσιο (CAS no 10377-60-3).

Όλες οι ουσίες ανήκουν στην ΚΣΥ 1.

Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών.

231

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
10 ΛΙΤΡΑ ( ~ 13,50 ΚΙΛΑ)**

CE

Εισάγεται στην Ευρώπη από:  
**FMC Agricultural Solutions A/S,**  
Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Δανία

**Παρασκευαστής: FMC Agro Ltd.,**  
Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK  
**Παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο**

**Ανασσκευασία-Αποκλειστικός διανομέας:**



1° χλμ. Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100, 19002, Παιανία,  
Τηλ.: 210.68.00.900, [www.hellafarm.gr](http://www.hellafarm.gr), e-mail : [info@hellafarm.gr](mailto:info@hellafarm.gr)

Τα FMC και Vertex HI-N™ είναι εμπορικό σήμα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.  
©2020-2022 FMC Corporation. All rights reserved.

#### Καλλιέργειες:

**Όπωροφόρα** (Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά, Βερυκοκιά) με δόση 200κ.εκ./στρέμμα. Προτείνονται 3 εφαρμογές. Η πρώτη 7-10 πριν την άνθηση, η δεύτερη μετά το τέλος της καρπόδεσης και μία Τρίτη 15 ημέρες μετά από την προηγούμενη. **Ειδικότερα** για τη μηλιά και τις κόκκινες ποικιλίες προτείνεται ένας ψεκασμός πριν πέσουν τα φύλλα μετά τη συγκομιδή για ενίσχυση με άζωτο των λοχχοειδών της μηλιάς (καρποφόρα όργανα).

**Εσπεριδοειδή** με δόση 100κ.εκ./στρέμμα. Τρεις εφαρμογές, μία προανθική και οι άλλες δύο μετά την καρπόδεση.

**Αμπέλι** με δόση 200-300κ.εκ./στρέμμα. Ψεκάστε με Vertex όταν υπάρχουν ανάγκες ή συνθήκες στρές.

**Ελιά** με δόση 300κ.εκ./στρέμμα. Ψεκάστε με Vertex 60-90 μέρες πριν την άνθηση της ελιάς. Επαναλάβετε τον ψεκασμό λίγο πριν την άνθηση και με το τέλος της καρπόδεσης της ελιάς με την ίδια δόση.

**Ακτινίδιο** με δόση 300κ.εκ./στρέμμα. Ανάλογα με τις ανάγκες των φυτών προανθικά και στην καρπόδεση με την ίδια δόση.

**Πατάτες** με δόση 150-300κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμογή από το «κλείσιμο των γραμμών» έως την τελευταία εφαρμογή για τον περονόσπορο. **Λαχανικά** με δόση 200κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμογή νωρίς (μετά τα τρία πραγματικά φύλλα) κατά την έντονη ανάπτυξη των φυτών αρκεί να υπάρχει ανεπτυγμένη φυλλική επιφάνεια για την απορρόφηση του ψεκαστικού υγρού.

**Θερμοκήπια** με δόση 75κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμογή νωρίς αρκεί να υπάρχει ανεπτυγμένη φυλλική επιφάνεια για την απορρόφηση του ψεκαστικού υγρού.

**Βαμβάκι, Καλαμπόκι** με δόση 200κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμογή σε ύψος 20-30 εκατοστών. Στο καλαμπόκι εάν χρειαστεί επανάληψη 15-20 μέρες μετά. **Σιτηρά, Ρύζι** με δόση 150κ.εκ./στρέμμα. Από την εμφάνιση του πρώτου γονάτου έως την εμφάνιση των ωτιδίων (να μην επαναλαμβάνεται η εφαρμογή σε μεσοδιάστημα μικρότερου των τριών εβδομάδων).

**Ελαιοκράμβη** με δόση 150-200 κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμογή κατά την επέκταση του στελέχους και μετά την ανθοφορία. Να μην εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.

**Γκαζόν** με δόση 500κ.εκ./στρέμμα. Σε περιόδους έντονης ανάπτυξης του χλοοτάπητα, επαναλαμβάνόμενες εφαρμογές ανά 30 ημέρες περίπου και ανάλογα με τις ανάγκες του χλοοτάπητα.

Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

**Συνδυαστικότητα:** Το σκεύασμα προτείνεται πριν αναμειχθεί με άλλα σκευάσματα να γίνεται μία μικρή δοκιμή. Δε συνδυάζεται με πολτούς και σκευάσματα με δραστική ουσία cyproconazole.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Προστατέψτε από τον πάγο. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία πάνω από 5° C. Αποθηκεύστε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος. Μην το αποθηκεύετε σε απ' ευθείας έκθεση στο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Κρατείστε το μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Συνιστάται τα αποτελέσματα της ανάλυσης εδάφους και ιστών να χρησιμοποιούνται όποτε είναι δυνατόν για να καθοδηγήσουν τις εφαρμογές μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών για τη βελτιστοποίηση της κατάστασης των θρεπτικών συστατικών της καλλιέργειας.

Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν σε πολύ έντονο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες άνω των 25° C.

Αν είναι δυνατόν, οι ψεκασμοί να γίνονται νωρίς το απόγευμα ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Το λίπασμα περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να υπάρξει πιθανή επίπτωση στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

**Προφυλάξεις:** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. **Πρώτες βοήθειες:** Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Εάν ο παθών διατηρεί τις αισθήσεις του, δώστε του να πει μισό λίτρο νερό αμέσως. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνεται αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα εκτός εάν έχουν κολλήσει στο δέρμα. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα από τον μολυσμένο χώρο επιβεβαιώνοντας την προσωπική σας ασφάλεια κατά την απομάκρυνση. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**