

Καθαρό Βάρος: 6 ΚΙΛΑ

Βάκιλλος της Θουριγγίας υποείδος Κουρστάκι

Εγγ. Σύνθεση:

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strain ABTS-351 MPCA 1,7%β/β  
(ισοδύναμο με 1000IU/mg)

Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100% β/β.

Περιέχει Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Αρ. Άδειας διάθεσης: 14515/3-6-2015

# BACTECIN

## DP

Σκόνη επίπασης (DP)

## Βιολογικό Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση προνυμφών των λεπιδοπτέρων

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

**Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο):** Για την καταπολέμηση της Ευδεμίδας. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων (L1) με δόση 3 κιλά / στρέμμα. 1-2 εφαρμογές ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 ημερών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 5.

**Πατάτα (μετασυλλεκτικά):** Για την καταπολέμηση της Φθοριμαίας. Εφαρμογή στους κονδύλους μετά τη συγκομιδή, κατά την αποθήκευση. Καλό σκόνισμα των κονδύλων κατά στρώσεις. Δόση 3 κιλά / τόνο πατάτας. Επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 15 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

**Λαχανικά Σολανώδη (Y+Θ):** Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κράμβες (Y): Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λαχανάκια Βρυξελλών, Κινέζικο Λάχανο, Μη κεφαλωτή κράμβη, Γογγυλοκράμβη, Μαρούλια και σαλατικά (Y): Μαρούλι, Λυκοτρίβολο, Σκαρόλες, (πικρίδα) πλατύφυλλα αντίδια, Κάβδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες, Γαιοκάρδαμο, Ρόκα, Κόκκινο σινάπι, Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα) (Y): Σπανάκι, Ανδράκλα, Σέσκουλα / φύλλα τεύτλων, ραδίκια witloof/ αντίβ, Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Φρέσκο κρεμμύδι, Πράσο, Αγκινάρα, Καπνός. Καταπολεμά Προνύμφες λεπιδοπτέρων: Spodoptera, Noctuidae, Mamestra, Acrolepia (Acrolepiopsis) assectella, Agrotis (Scotia) segetum, Mamestra brassicae, Depressaria erinaceella, Evergestis forficulis, Tuta absoluta, Helicoverpa (Heliothis) armigera, Helicoverpa (Heliothis) spp., Spodoptera exigua, Pieris brassicae, Pieris rapae, Plusia spp, Plutella xylostella, Plutella spp., Mamestra oleracea, Phytometra (Autographa) gamma, Spodoptera littoralis, Spodoptera spp., Trichoplusia ni, Vanessa cardui. Δόση 3 κιλά / στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων (L1). 1-3 εφαρμογές ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 ημερών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο: 5.

**Παρατήρηση:** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες: φρέσκο κρεμμύδι, πράσο, αγκινάρα και καπνός από τη χρήση του σκευάσματος. Για αυτές τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**Τρόπος εφαρμογής:** Επίπαση του φυλλώματος των καλλιεργειών ή της επιφάνειας των πατατοσωρών κατά στρώσεις. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη του φυλλώματος των καλλιεργειών ή των στρώσεων των πατατοσωρών.

**Τρόπος δράσης:** Βιολογικό εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των προνυμφών των λεπιδοπτέρων. Το προϊόν δρα από στομάχου και πρέπει να καταποθεί από τις προνύμφες για να είναι αποτελεσματικό. Λίγες ώρες μετά την κατάποση, οι προνύμφες παύουν να τρέφονται και πεθαίνουν τις επόμενες ημέρες.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**Συνδυαστικότητα:** Δε συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.

**Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:** Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης: 0 ημέρες.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα σάκια ή φιάλες που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Χρονική Σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης:** Αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλεισμένη συσκευασία του, μακριά από το ηλιακό φως, σε χώρο αεριζόμενο και χωρίς υγρασία, με θερμοκρασία κάτω από 30°C. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**-Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.-Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.-Αποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη. **Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια (EN166: 4 ή άλλο ανάλογο)/μάσκα για σκόνης (EN 149 FFP1 ή άλλη ανάλογη).** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **“ Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”**

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Κάτοχος της άδειας -  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση  
στην αγορά:

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,  
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ, ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΟΣ:  
βλέπε επί της συσκευασίας

1° χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002, Παιανία,  
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr