

ProGibb® 40SG

ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ ΚΟΚΚΟΙ

Φυτορρυθμιστική ουσία

gibberellic acid (γιββερελλικό οξύ) 400g/kg

Εγγυημένη σύνθεση: **gibberellic acid (Ga3) 40,00% β/β**
Βοηθητικές ουσίες 60,00% β/β

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 8245/ 7.3.2016



1910 Innovation Way, Suite 100 Libertyville, IL 60048, ΗΠΑ
ProGibb® is a registered trademark of Valent BioSciences LLC, U.S.A.

Παρασκευαστής: Valent BioSciences LLC, Η.Π.Α.
Κάτοχος της άδειας: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crecy,
10A rue de la Voie Lactee, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.



1^ο χλμ. Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100, 19002, Παιανία,
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν το χρησιμοποιείτε σε κλειστούς χώρους. - Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό. - Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεβγάλετε το στόμα. Μην προκαλείτε ποτέ εμετό σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή βρίσκονται σε σύγχυση. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε πάντα έναν γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο που έχει εισπνεύσει το προϊόν στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεβγάλετε σχολαστικά με άφθονο νερό. Τα βλέφαρα θα πρέπει να μένουν ανοιχτά επιτρέποντας το σχολαστικό ξεβγάλμα του βολβού του σφαλμού. Σε περίπτωση επιδείνωσης του ερεθισμού συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ρυθμιστής της ανάπτυξης των φυτών. Το προϊόν προωθεί την ανάπτυξη του μίσχου μέσω της επιμήκυνσης του κυττάρου και τη διακοπή της φυτικής νάρκης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ψεκασμούς καλύψεως φυλλώματος στην ανιστάμενη δόση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού με νερό μέχρι το απαιτούμενο επίπεδο και προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα ProGibb 40SG. Συστήνεται μόνο ελαφριά ανάδευση για να διαλυθεί το προϊόν. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Ξεβγάξτε τον εξοπλισμό εφαρμογής με νερό ή με άλλα ειδικά προϊόντα, ενώ παράλληλα αφαιρείτε όλα τα αποσώμενα εξαρτήματα του ψεκαστήρα (π.χ. ακροφύσια) για καλύτερο καθαρίσμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Για την πρόβλεψη της συγκομιδής και την αύξηση της απόδοσης συνιστάται δόση 5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια των ανθέων (BBCH41-43). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1-2 (ανά 14-21 ημέρες)

ΣΤΑΦΥΛΙΑ (επιτραπέζια σταφύλια - Σουλτανίνα): Για τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και της απόδοσης μέσω επιμήκυνσης της συστάδας, λεπτινωσης και αλλαγής μεγέθους των ραγών συνιστάται δόση 7,5 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Για τη Σουλτανίνα εφαρμόστε όταν το μήκος του στελέχους είναι περίπου 4-10cm μέχρι το 75% των ραγών να είναι 3-6mm. Συστήνονται συνολικά πέντε επεμβάσεις για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του πλήρους μεγέθους των ραγών. Δείτε λεπτομερείς πληροφορίες πιο κάτω. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 5 (ανά 2 ημέρες)

ΣΤΑΦΥΛΙΑ (οινοποιήσιμα): Για τη μείωση των μικρών διαστάσεων της συστάδας, τη βελτίωση του αερισμού και την ενίσχυση της αντιμετώπισης των ασθενειών και των παρασίτων και, κατά συνέπεια, της ποιότητας του κρασιού συνιστάται δόση 5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Κατευθύνετε τα σωματίδια του ψεκασμού στην περιοχή των ταμιπών. Εφαρμόστε στο 30-50% πεσμένων ανθέων. BBCH 63-65. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1

ΕΞΕΠΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμόνια, Πορτοκάλια (εκτός Valencia), Μανταρίνια, Γκρέιπ φρούτ): Για τη βελτίωση της καρπόδεσης συνιστάται δόση 2,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόστε από την πτώση των πετάλων μέχρι το ξεκίνημα της πτώσης των καρπών (BBCH 67 και BBCH 71). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2 (ανά 7 ημέρες). Για τη βελτίωση της ποιότητας του φλοιού του καρπού και τη βελτίωση της συγκομιδής συνιστάται δόση 2,5-5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόστε όταν οι καρποί ξεκινούν να αλλάζουν χρώμα (BBCH 81). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-300 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1

ΚΑΛΑΜΠΟΠΙΣΤΙΚΑ: (εσωτερική χρήση): Για επιμήκυνση του στελέχους σε κομμένα άνθη συνιστάται δόση 3,75 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόστε μέσα σε 1 βδομάδα από τη μεταφύτευση. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1

ΑΧΛΑΔΙΑ: Για τη βελτίωση της καρπόδεσης, του βάρους των καρπών και της απόδοσης συνιστάται δόση 1,25-2,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόστε στο 30-50% της πλήρους άνθησης στην περίπτωση μη παγετού (BBCH 63-65). Σε περίπτωση παγετού εφαρμόστε κατά την περίοδο της άνθησης (BBCH 57-69) και όχι αργότερα από 48 ώρες μετά τον παγετό. Εφαρμόστε ξανά σε περίπτωση περαιτέρω περιστατικών παγετού. Εφαρμόστε την υψηλή δόση όταν η φυσική καρπόδεση είναι χαμηλή. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1-3 (ανά 2 ημέρες)

ΓΑΥΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ: Για τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και της απόδοσης συνιστάται δόση 5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόστε όταν οι πρώτοι καρποί αλλάζουν χρώμα από πράσινο σε ανοιχτό κίτρινο (χρώμα άχρυσου) (BBCH 81). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρόνοι εφαρμογών για άσπερμα επιτραπέζια σταφύλια: Πέντε εφαρμογές. Οι εφαρμογές ξεκινούν όταν ο 1ος βραχίονας ξεκινά να κινείται στη συστάδα (μήκος στελέχους ~ 4-10 εκ, BBCH55-57) • Δεύτερη εφαρμογή στο 50% ανοιχτών ανθέων (BBCH65) • Τρίτη εφαρμογή στο 80% των ανοιχτών ανθέων (BBCH68) • Τέταρτη εφαρμογή στο 50% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH73-75) • Πέμπτη εφαρμογή στο 75% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH73-75). Οι πρώτοι τρεις ψεκασμοί γίνονται στα 100 L/στρ. και οι τρεις τελευταίοι ψεκασμοί στα 200 L/στρ.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν θα πρέπει να εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν υπάρχουν ενδείξεις φυτοτοξικότητας όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις, στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το ProGibb 40SG, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ορθή γεωργική πρακτική (EU GAP), δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε δοχείο ανάμειξης.

Τελευταία επεμβάση πριν τη συγκομιδή: Δεν απαιτείται Προφυλάξεις για τους χειριστές: Θα πρέπει να λαμβάνονται οι συνθήκες προφυλάξεις όσον αφορά το χειρισμό των χημικών ουσιών.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόρριψη των υπολειμμάτων του προϊόντος και της μολυσμένης συσκευασίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς της κυβέρνησης ή των τοπικών αρχών.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύεται το προϊόν σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Φυλάσσετε το μακριά από φαγητά, ποτά και ζωοτροφές. Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

2010

