

## ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Βοριούχο λίπασμα σε μορφή αιωρήματος (βορικό ασβέστιο)

### ΣΥΝΘΕΣΗ:

7 % βόριο (B) υδατοδιαλυτό (101 g/l)

Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

**Σπαράγγι:** 4x200ml/στρέμμα κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης. **Λάχανο:** 300ml/στρέμμα, δύο εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση. **Καρότο:** 300 ml/στρέμμα, στο στάδιο των 10-15 cm. **Καρποφόρα δένδρα:** 200 ml/στρέμμα, πριν την άνθηση και 200 ml/στρέμμα μετά τη συγκομιδή ως αποθήκευση για την επόμενη χρονιά. **Τριφύλλι-Μηδική:** 100 ως 300 ml/στρέμμα, μετά από κάθε κοπή. **Ελιές:** 200 ml/στρέμμα πριν την άνθηση. **Κρεμμύδι, σκόρδο:** 2x200ml/στρέμμα, στο στάδιο των 10 cm και 15 μέρες αργότερα. **Μπιζέλι, σόγια, φασόλι:** 300 ml/στρέμμα, στο στάδιο των 8-10 cm. **Ελαιοκράμβη:** 400 ml/στρέμμα στην έναρξη επιμήκυνσης στελέχους. **Φράουλες:** 300 ml/στρέμμα πριν και μετά από κάθε ανθοφορία. **Ζαχαρότευτλα:** 500 ml/στρέμμα στο στάδιο των 10 ως 15 φύλλων. Σε φτωχά εδάφη, 500 ml/στρέμμα επιπλέον στο κλείσιμο των σειρών. **Ηλιάνθος:** 300 ml/στρέμμα στα 4-5 ζεύγη φύλλων. **Αμπέλι:** 300 ml/στρέμμα πριν την ανθοφορία και 300 ml/στρέμμα μετά την ανθοφορία

**Οδηγίες:** Ανακινήστε το δοχείο και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα στον ψεκαστήρα. **Συνδυαστικότητα:** Αν αναμιχθεί με άλλα προϊόντα, προτείνεται να προηγηθεί δοκιμή μικρής έκτασης. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ανάμιξη του λιπάσματος με άλλα προϊόντα. **Τρόπος εφαρμογής:** Διαφυλλικοί ψεκασμοί.


**ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** H360 - Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο.

P201 - Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P308+P313 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Ουσία που συμβάλλει στην ταξινόμηση ως: disodium octaborate.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:  
10 λίτρα= 14.4 κιλά



EGL0572T  
V3



Παρασκευαστής:  
**Rosier S.A.**

Route de Grandmetz 11a  
7911 Moustier, BELGIQUE  
Tel:+32 (0) 69 87 15 10  
www.rosier.eu



Διάθεση στην Ελλάδα:

**ΑΘΗΝΑ:**  
Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23  
Τηλ.: 210.68.00.900  
www.hellafarm.gr -  
e-mail: info@hellafarm.gr