



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ● Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά ● Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. «Να φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά τις διάφορες φάσεις χρήσης του σκευάσματος». «Δεν θα πρέπει να εισέλθετε στον αγρό που έχει ψεκαστεί πριν από 48 ώρες από την εφαρμογή». **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.”**

Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλεφάρια, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός και επιμένει, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. **Πληροφορίες για το γιατρό:** Θεραπεία συμπτωματική. Εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα (μεγαλύτερη από μια γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium sulfate. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Το σκεύασμα περιέχει ως διαλύτη αρωματικούς υδρογονάνθρακες. **Αντίδοτο: Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα:** Γαστρεντερικές διαταραχές, εμετός, διάρροια. **Θεραπεία:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία. **Αντένδειξη:** παράγωγα της αδρεναλίνης, Παρακολούθηση λειτουργίας νεφρών, ήπατος και παγκρέατος. Σε περίπτωση κατάποσης κάνετε πλύση στομάχου εφόσον έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα μόνο στις 2 πρώτες ώρες. Ωστόσο, συνιστάται σε κάθε περίπτωση η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικό νάτριο. Εάν έχει καταποθεί ποσότητα ίσης ή μεγαλύτερης μιας γουλιάς, τα ακόλουθα μέτρα συνιστάται να ακολουθηθούν: Εξάλειψη με διάλυση (εξαναγκασμένη αλκαλική διαίурηση).

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 m. Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 m από τις γειτονικές καλλιέργειες

Αρ. Παρτίδος, Ημερ. Παρασκευής-Ημ.Λήξης: Βλέπε άνω μέρος φιάλης

TETRAMOR

6,9EW

Εναιώρημα,
λάδι σε νερό (EW)

φenoξapop-p-εθύλ ομάδα Aryloxyphenoxy propionic acid

Εγγυημένη Σύνθεση:

Δραστική ουσία: fenoxaprop-P-ethyl 6,9 % β/ο

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: Cloniquitocet-mexyl 3,45% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 93.09% β/β

Περιέχει ως διαλύτη αρωματικούς υδρογονάνθρακες

Αρ. άδειας διάθεσης στην αγορά:

70.052/22-7-2013

Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι.

Κάτοχος της άδειας-
CHEMINOVA AGRO SA,
Paseo De La Castellana 257, 5o -28046,
Madrid, Spain

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
του προϊόντος στην αγορά:



ΑΘΗΝΑ:

Φλέμεγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
www.hellafarm.gr - info@hellafarm.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 ΛΙΤΡΟ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι.

Το TETRAMOR 6,9 EW απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και τον βλαστό και μεταφέρεται στις ρίζες και τα ριζώματα. Μετά την εφαρμογή οι νεότεροι ιστοί των φύλλων γίνονται χλωρωτικοί (κίτρινοι) ή νεκρωτικοί (καφέ) και τα φύλλα αποσιχίζονται εύκολα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η νέκρωση των ζιζανίων.

Καλλιέργεια, στόχος και δοσολογία: Καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και μαλακό) με δόση 100-120 κ.εκ./ στρέμμα και στο κριθάρι με δόση 100 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-30 λίτρα/ στρέμμα.

Τρόπος χρήσης και χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιερητική περίοδο: 1**

Παρατηρήσεις: 1) Το TETRAMOR 6,9 EW εφαρμόζεται από το στάδιο των 2 φύλλων των ζιζανίων μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου. Ειδικά στη φάληρη συνιστάται να εφαρμόζεται μέχρι τα μέσα του αδελφώματος. 2) Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια ξεπεράσουν το στάδιο του αδελφώματος καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση της φάληρης. 3) Να μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

Ευαίσθητα ζιζάνια: Σιτάρι (Setaria spp.) - Τραχεία λειβαδοπόα (Poa trivialis) - Αλεπονουρά (Alopecurus spp.) - Αγριοβρώμη (Avena spp.) - Φάληρη (Phalaris spp.) - Ανεμόχορτο (Apera spica-venti)

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμός φυλλώματος με 10-30 λίτρα νερό ανά στρέμμα με πίεση 2,5-3 atm. (38-45 PSI) και μικρό τύπου ακούπας. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα 3/4 με νερό. Ανακινήστε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδύοντάς συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Στην περίπτωση που αδειάζει η φιάλη, τότε ξεπλύνετε τρεις φορές και ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο δοχείο του ψεκαστικού. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες βρώμης. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια καλλιερητική περίοδο μπορούν να σπαρούν αραβόσιτος και σόργο αφού μεσολαβήσουν τρεις (3) εβδομάδες μετά την εφαρμογή του TETRAMOR 6,9 EW. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν βρίσκεται εφαρμογή (τελευταία επέμβαση μέχρι και τον σχηματισμό του δεύτερου κόμβου των καλλιεργειών).

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του απαράβαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (5-30 °C) και καλά αεριζόμενο μέρος, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα αναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.