

# DUXON 13,9 SL

ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 13,9%

Υγρό υδατοδιαλυτό (SL)

Εγγ. σύνθεση: Άλατα καλίου λιπαρών οξέων: 13.9 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 86.1 % β/β

Αριθμός έγκρ. κυκλοφ.:  
1965/ 28.01.03

## ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (π.χ. του αλευρώδη σε τομάτα και αγγούρι)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κότοχος της έγκρισης:  
Sonderstrup Sæbefabrik A/S,  
Stengardsvej 1-3, DK-4340 Tølløse)  
Denmark

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900-9  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τοχ. Θυρίδα 1203, Β.Π.Ε.Ο, 57022 Σινδός, τηλ.: 2310.797.907  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9  
e-mail: info@hellafarm.gr

09/13

Περιεχόμενο:  
1,9 λίτρα  
για 100 λίτρα νερό

### ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΧΘΡΟΙ:

-Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά, γκρειπ-φρούτη): Αλευρώδης, Αφίδες, Κοκκοειδή, Θρίπες, Ακάρεα. - Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φουντουκά, Καρπούζι): Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Ακάρεα. - Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιδή): Αφίδες, Κοκκοειδή, Θρίπες, Ακάρεα. - Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά): Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Βαμβακάδα, Ακάρεα. - Αρπέλι: Θρίπες, Κοκκοειδή, Τζιτικάκια, Ακάρεα. - Λαχανικά υπαίθρου και θερμοκηπίου (τομάτα, αγγούρι, ππεριά, μελιτζάνα, φασόλια, μπιζέλια, κολοκύθι, κολοκύθες, πεπόνι, καρπούζι, λάχανα, κουνουπίδια): Αλευρώδης, Αφίδες, Βρωμούσες, Θρίπες, Ακάρεα. - Καλλωπιστικά - Φυτά εσωτερικού χώρου: Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Ακάρεα.

Γενική δόση: 1900 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό.

Χρόνος εφαρμογής: Με την ευφάντηση της προβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων.

Παρατηρήσεις: 1. Στην ολοκληρωμένη καταπολέμηση του αλευρώδη στην τομάτα και το αγγούρι θερμοκηπίου και υπαίθρου γίνεται εφαρμογή όταν ο πληθυσμός του αλευρώδη είναι 3 περίπου ακμάια ανά δύο φύλλα και 10-20 προνύμφες 2<sup>η</sup> και 3<sup>η</sup> σταδίου ανά φύλλο ή μεγαλύτερος. Μετά από 1-2 ημέρες γίνεται η πορώτη εξαπόλυτη του παρασίτου Encarsia formosa σε πληθυσμό 2-3 άτομα/ φύτε για καλλιέργεια θερμοκηπίου ή 2000-3000 άτομα/στρέμμα για καλλιέργεια υπάθρου. Αν τα αποτελέσματα δεν είναι κανονιστικά και ο αριθμός των ακμάων και προνύμφων του αλευρώδη είναι εκείνος που αναφέρθηκε πιο πάνω γίνεται δεύτερη εφαρμογή του οκευάσματος πριν από τη 2<sup>η</sup> και 3<sup>η</sup> εξαπόλυτη του Encarsia formosa.

Διατηρείται ένα διάστημα 15 μηνών μεταξύ των δύο εφεκασμάτων.

2. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:

Εσπεριδοειδή 200-400 λίτρα  
Ακρόδρυα 100-150 λίτρα  
Μηλοειδή 150-250 λίτρα  
Πυρηνόκαρπα 150-250 λίτρα  
Αρπέλι 50-150 λίτρα  
Λαχανικά 50-150 λίτρα

3. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητη κατηγορία: 1-4 εφαρμογές.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης φυλλώματος. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί να μην είναι σκληρό. Αν είναι δύναται να χρησιμοποιείται βρόχινο ή απεταγμένο νερό. Να μην γίνεται εφαρμογή με δύνατο ή μεγάλη υγρασία. Φυτά σε κατάσταση στρές δεν πρέπει να ψεκάζονται.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο την απαιτούμενη δόση. Συμπληρώνουμε στην συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή αναδέυση.

Καθαρισμός ψεκαστή: Αμέωνας μετά την εφαρμογή αδειάζετε τελείως τον ψεκαστή. Ξεπλένετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφύλαξεις σταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού μοντά σε υδατίνους πάρους.

Φυτοτοκιότητα: Δεν είναι φυτοτοκιό στις συνιστώντας δόσεις και καλλιέργειες.

Συνόδιαστικότητα: Δεν συνέπειται με αλκαλικά σκευάσματα και ροτενόν.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: υπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και πριν τη συγκομιδή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέρα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ώτι γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προσπογυμένας με τρύπα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποθίνεται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύλωση ή ανάτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΟΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή του συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και χωτοφρές. - Απορύνετε την επαφή με το δέρμα και τα ματιά.

"Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης."

Πρώτες βοηθείες - Αντίδοτο: -Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυνθείτε καλά με αφθονό νερό. -Σε περίπτωση επαφής με τα ματιά ξεπλύνετε τα μάτια με άρδινο νερό για 15'. Αν ο ερεθισμός επιμένει απευθύνετε σε γιατρό. -Σε περίπτωση κατάστοσης ξεπλύνετε το σώμα με άρδινο νερό. Πιετε άρδινο νερό και ζητήστε απρική συμβολή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΕΠΙΒΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΑΡΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Αποφεύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Ηρ. παρασκευής, Ηρεμ. Λίζης, Αρ. Παρτίδας: Ήλεγε άνω μέρος φιάλης.

09/13