

Magnet MED™

Deltamethrin (Δελταμεθρίν) 0.03% (χημική ομάδα: πυρεθρίνες)




ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά -Μην τρώτε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν- Αποθηκεύτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμηνικά κλειστός - Αποφεύγετε να αναπνέετε στην ρύπους -Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά τον χειρισμό - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο - Να φοράτε προστατευτικά γάντια «Το άνοιγμα της συσκευασίας να γίνεται σε αεριζόμενο χώρο» «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλα γάντια όταν κατά την περίοδο που πραγματοποιούν εργασίες στα φυτά, υπάρχουν αναρτημένες οι παγίδες.» «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ζητήστε αρέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το φυτοπροστατευτικό προϊόν ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήθει ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε /Επισκεφτείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ



ΤΕΜΑΧΙΑ (ΠΑΓΙΔΕΣ): 25

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε πλαίσιο παραπάνω

Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB)

ΑΙΔΑ: 14416/13-3-2013

Εγγυημένη σύνθεση:

deltamethrin 0.03% β/β [= 10 mg/panel] βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β

Το Magnet MED βασίζεται στην τεχνική της προσέλκυσης και θανάτωσης (attract & kill). Αποτελείται από παγίδες (πάνελ) ειδικά διαμορφωμένες έτσι ώστε να αναρτώνται εύκολα στα κλαδιά των δέντρων. Στις παγίδες περιέχεται ελκυστικό τροφής ενώ η εξωτερική επιφάνειά τους είναι καλυμμένη με τη δραστική ουσία deltamethrin. Τα ακμαία της μύγας της Μεσογείου προσέλκυνται από το τροφικό ελκυστικό και όταν έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια της παγίδας, θανατώνονται.

Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Κάτοχος της άδειας: Suterra Europe Biocontrol S.L., Plaza América 2, Planta 9 46004 Valencia, Ισπανία

Suterra®

Υπεύθυνος επικοινωνίας -
Υπεύθυνος για τελική διάθεση
στην αγορά: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ.

 **χελλαφάρμ** A.E.

1° Χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100,
19002, Παιανία Τηλ.: 210.68.00.900,
info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

Πεδίο εφαρμογής: Επεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, κιτριά, φράπα, γκρέιπ-φρουτ κ.ά υβριδιά), Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, μουσουλιά, Nashi (αχλαδόμηλο)), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, βερικοκιά, νεκταρινιά, κερασιά, βυσσινιά, δαμασκηνιά, κορομηλά), Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο), Λωτός, Φραγκοκυδιά. Στόχος: Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata)

Δοσολογία: 5-7.5 τεμάχια (παγίδες/ στρέμμα)

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Η ανάρτηση στα φυτά πρέπει να γίνει νωρίς, κατά προτίμηση με χαμηλό πληθυσμό ενηλίκων του εντόμου, πριν την ωρίμανση των καρπών και σε κάθε περίπτωση πριν το έντομο προσβάλει την καλλιέργεια. Για βέλτιστο προσδιορισμό του χρόνου εφαρμογής, ακολουθήστε τις ενδείξεις παγίδων παρακολούθησης και τις συμβουλές των γεωργικών προεδρικούς ουσίες υπάρχουν. Το εύρος του αρθρού των παγίδων κυμαίνεται ανάλογα με την ευπάθεια της καλλιέργειας και τον πληθυσμό της Μύγας Μεσογείου.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητη περίοδο: 1

Παρατηρήσεις: 1) Τοποθετήστε τις παγίδες κατά προτίμηση στο μέρος του φυτού που είναι προσαντολισμένο προς τον νότο και στο μεγαλύτερο ύψος που μπορείτε από το έδαφος, προσέχοντας να επιλέγετε κλαδιά αρκετά γερά τα οποία δεν θα κλαδευτούν πριν από το έπος της καλλιέργητης περιόδου. 2) Μην χρησιμοποιείτε παγίδες αν προέχονται από συσκευασίες κατεστραμμένες, τρύπιες ή ανοιγμένες. 3) Η συγκεκριμένη μέθοδος προσέλκυσης-θανάτωσης δίνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όταν η εφαρμογή γίνεται σε συγκεντρωμένους οπωρώνες/αμπελώνες με εκτεταμένη επιφάνεια και ομαλό σχήμα. 4) Σε περίπτωση γειτνίασης του οπωρώνα/ αμπελώνα με άλλους στους οποίους δεν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μέθοδος ή σε περίπτωση γειτνίασης με αυτοφυή βλάστηση που προσβάλλεται από τη Μύγα Μεσογείου, συνιστάται η ενίσχυση των ορίων με συμπληρωματικό αριθμό παγίδων. 5) Μία εφαρμογή αρκεί για την καταπολέμηση του εντόμου για ολόκληρη την περίοδο.

Τρόπος εφαρμογής: Αναρτήστε τις παγίδες στα κλαδιά μέσω του ειδικού γάντζου. Βεβαιωθείτε ότι η κάθε παγίδα έχει στερεωθεί καλά στο κλαδί.

Ειδικές συνήθικες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε: Μην αναρτάτε τις παγίδες κοντά ή πάνω από την περιοχή ανάπτυξης των καρπών για να μην έρχονται σε άμεση επαφή με αυτούς. **Φυτοτοκιότητα:** Δεν είναι φυτοτοκιό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Μη εφαρμόσιμο. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι παγίδες μετά τη χρήση τους και τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. **Συνήθικες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκεύασματος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και θερμοκρασία όχι πάνω από 40°C.