

BRANDT® Manni-Plex® Zn

Ψευδαργύρου

Λίπασμα ταχείας απορρόφησης



Σύνθεση

Ολικό άζωτο (N).....	3,0% β/β
2,8% β/β Νιτρικό άζωτο	
0,2% β/β Ουρικό άζωτο	
Ψευδάργυρος (Zn) υδατοδιαλυτός.....	7,0% β/β

Διάλυμα ψευδαργυρού οξείδου λιπάσματος (νιτρικός ψευδάργυρος)

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της ετικέτας πριν τη χρήση. Για την ασφάλεια ανθρώπων και περιβάλλοντος ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας της ετικέτας. Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο αναγνωρισμένων καλλιεργητικών απαιτήσεων. Μην εφαρμόζετε υπερβολικές δόσεις από τις προτεινόμενες στην ετικέτα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ


Στόχος-πλεονεκτήματα

Το BRANDT MANNI-PLEX Zn βασίζεται σε μία μοναδική τεχνολογία που καθιστά τα θρεπτικά συστατικά του άμεσα διαθέσιμα στα φυτά. Πρόκειται για ένα μίγμα οσκήλων και αλκοολών με μικρό μοριακό βάρος που επιτρέπουν την ταχεία απορρόφηση και μετακίνηση των θρεπτικών συστατικών μέσω του ξυλώδους και φλοιώδους παρεγχύματος των φυτών στις ζώνες ανάπτυξης και τους καρπούς. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το BRANDT MANNI-PLEX Zn ιδανικό για την πρόληψη και θεραπεία των τροφωπενιών ψευδαργύρου και των συμπτωμάτων που σχετίζονται με αυτή (π.χ. χλωρώσεις στα νεαρά φύλλα του καλαμποκιού, σόργου, ρυζιού, σόγιας, φασολιού και μπζελιού και πατάτας, σχηματισμός ροζέτας σε εσπεριδοειδή, αμπέλια και τις υπόλοιπες δενδροειδείς καλλιέργειες, μικροφυλλία, καχεκτική ανάπτυξη, μείωση του μεσογονιού διαστήματος), ενώ παράλληλα ενισχύει την βλαστική ανάπτυξη των φυτών, καθώς και την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και αυξάνει την απορροφητικότητα των θρεπτικών στοιχείων.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Εφαρμογή: α) με ψεκασμό φυλλώματος σε δόση 200-300 κ.εκ. /στρέμμα χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο όγκο νερού για πλήρη κάλυψη. Η επίδραση της κατάλληλης δόσης, από το προτεινόμενο εύρος, εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας. Συνιστώνται τουλάχιστον δύο-τρεις εφαρμογές κατά την πρώτη βλαστική ανάπτυξη, πριν την άνθηση και αμέσως μετά τη συγκομιδή, ενώ η βλάστηση παραμένει πράσινη. β) με υδρολίπασμα

Διανομέας:


HELLAFARM Α.Ε.
1^η χλμ. Α. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100
19002, Παιανία, Ελλάδα
Τηλ.: 210.68.00.900
info@hellafarm.gr - www.hellafarm.gr

Περιεχόμενο: 1 λίτρο
Καθαρό Βάρος: 1,23 kg



Παρασκευαστής:


BRANDT Europe, S.L.
Ctra. Carmona - Guadajoz, Km 3.1
41410 Carmona (Σεβίλλη) Ισπανία
+34 954 196 230
www.brandt.co

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

σε δόση 500-1000 ml /στρέμμα ανάλογα με την περιεκτικότητα του εδάφους σε ιγνοστοχεία και τις ανάγκες της καλλιέργειας. Βεβαιωθείτε ότι δεν εφαρμόζονται αλκαλικά φωσφορικά ή πολύ αλκαλικά διαλύματα κατά τη διάρκεια της υδρολίπασσης.

Δοσολογία (ψεκασμός φυλλώματος)

Καλλιέργεια	Δοσολογία κ.εκ./100 λίτρα νερού	Χρόνος εφαρμογής
Εσπεριδοειδή	200-300	Κατά την βλαστική ανάπτυξη, πριν την άνθηση και αμέσως μετά τη συγκομιδή
Ακτινίδιο	200-300	Κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, πριν την άνθηση
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)	200-300	Σε όλα τα βλαστικά στάδια ανάπτυξης
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, νεκταρίνια, δαμασκηνιά, βερικοκιά, κεράσια)	200-300	Κατά την βλαστική ανάπτυξη, πριν την άνθηση και αμέσως μετά τη συγκομιδή ενώ η βλάστηση παραμένει πράσινη.
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	250-400	Κατά την βλαστική ανάπτυξη
Φρούλα	250-400	Κατά την βλαστική ανάπτυξη
Ντομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πατάτα	200-300	Στην πρώτη φάση της βλαστικής ανάπτυξης
Πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθι, αγγούρι, αγκινάρα	200-300	Μετά τη μεταφύτευση κατά την πρώτη φάση της βλαστικής ανάπτυξης
Φασόλι, μπζέλι, σπανάκι	200-300	Στην πρώτη φάση της βλαστικής ανάπτυξης
Αραβόσιτος, σόργο, σόγια, ζαχαρότευτλα, καπνός, πατάτα, ριλιανθος, ρύζι, ελαιοκράμβη	200-300	Στην πρώτη φάση της βλαστικής ανάπτυξης
Καλλωπιστικά	150-250	Κατά την βλαστική ανάπτυξη, πριν την άνθηση

Παρατηρήσεις: Η χαμηλότερη δόση θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τα πρώτα φαιολογικά στάδια. Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο κατά το 1/3 έως 2/3 με καθαρό νερό. Προσθέστε τυχόν προσκολλητικά προϊόντα και αναδεύετε για αρκετά λεπτά. Προσθέστε τυχόν φυτοπροστατευτικά προϊόντα και συνεχίστε την ανάδευση για αρκετά λεπτά. Στο τέλος προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα BRANDT MANNI-PLEX Zn υπό συνεχή ανάδευση μέχρι την πλήρη ανάμιξη. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο απαιτούμενο νερό και συνεχίστε την ανάδευση μέχρι την εφαρμογή.

Συνδυαστικότητα

Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εκτός από τα σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης, τα ορκετρίλια και τα πολυσουλφιδία) και με τα περισσότερα λιπάσματα, εκτός από εκείνα τα οποία περιέχουν αλκαλικά φωσφορικά ή είναι πολύ αλκαλικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Πρώτες βοήθειες

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Κρατήστε τον παθόντα σε ηρεμία. Μην προκαλείτε ΠΟΤΕ εμετό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Αν η αναπνοή δεν είναι κανονική ή σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και εκφύσον είναι εύκολο. Πλύνετε τα μάτια με άφθονο καθαρό και δροσερό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα ενδελεχώς με νερό και σαπούνι ή με ένα κατάλληλο καθαριστικό δέρματος. Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ διαλύτες ή αραιωτικά. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία που επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Πηλ μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Αποθήκευση και απόρριψη

Μην μολύνετε το νερό, τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές κατά την αποθήκευση ή την απόρριψη του περιεχομένου των προϊόντων ή της συσκευασίας του. Διατηρείτε σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης (θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 25°C), σε δροσερό και ξηρό χώρο, προστατευμένο από πηγές θερμότητας και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσεται μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και υλικά ισχυρά οξινής ή αλκαλικής αντίδρασης. Απορρίψτε το περιεχόμενο στο δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο Κατασκευαστής εγγυάται ότι το Προϊόν συμμορφώνεται με τη χημική περιγραφή που δίδεται στην ετικέτα και είναι κατάλληλο για το σκοπό που δηλώνεται όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν παρέχουν καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης της εμπροθεωρημένης ή της καταληλυθότατος για τη συγκεκριμένη χρήση. Ο Λογιστής και ο Χρήστης αποδέχονται όλους τους κινδύνους που απορρέουν από οποιαδήποτε χρήση αυτού του Προϊόντος. Στην έκταση που προβλέπεται από το νόμο, ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν φέρουν ευθύνη στον αγοραστή ή στο χρήστη αυτού του προϊόντος για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική, τυχαία ή έμμεση ζημία.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα ετικέτα αποτελούν ιδιοκτησία ή διατεθούν δόσει από την BRANDT Europe, S.L

Αριθμός παρτίδας: βλέπε επί της συσκευασίας

