

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Προφυλάξεις:** •Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. •Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και προστατευμένο από την υγρασία. •Διατηρήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, σπίθες και φλόγες.

**Πρώτες βοήθειες:** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση ερεθισμού. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με τρεχούμενο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό αν εμφανιστεί ερεθισμός. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση αδιαθεσίας. Σε περίπτωση εισπνοής, μετακινήστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση αδιαθεσίας. **Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777**

Στον αγρό το **Borregro HA-1**: • Βελτιώνει την παραγωγή, αυξάνοντας τη βιο-απορροφητικότητα και δράση λιπασμάτων βασικών, δευτερευόντων και ιχνοστοιχείων. • Ενεργοποιεί προϋπάρχοντα στο έδαφος προϊόντα θρέψης. • Βελτιώνει το φύτρωμα των σπόρων. • Προκαλεί ανάπτυξη των ριζών. • Υποβοηθεί τον πολλαπλασιασμό ωφελίμων μικροοργανισμών στο έδαφος.

**Χρόνος Αποθήκευσης:** Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του και προστατευμένο από υγρασία, το προϊόν παραμένει σταθερό επί πολλά χρόνια.

**Ημ. παρασκευής, Αρ. Παρτίδας:** Βλέπε άνω μέρος συσκευασίας

**BORREGRO HA-1**

Καθαρό  
βάρος  
**3**  
κιλά

Υδατοδιαλυτή σκόνη

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών.  
Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά για χρήση στη γεωργία σύμφωνα με την υπ' αριθ. 217217/2004 (Β'35) υπουργική απόφαση.

Σύνθεση: 70% χουμικά οξέα (κατ' ελάχιστον)  
προερχόμενα από λεοναρδίτη.

**Χουμικά οξέα υψηλής αποτελεσματικότητας**

**ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ**

Προϊόν: Borregaard Deutschland GmbH

Συσκευασία - Διανομή:



1<sup>ο</sup> χλμ. Α. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002, Παιανία,  
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

**Προτάσεις για Τρόπους Εφαρμογής και Δόσεις**

Το BORREGRO HA-1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορα συστήματα αρδεύσεως και σε όλες τις καλλιέργειες όπως Οπωροφόρα, Εσπεριδοειδή, Σιτηρά, Βαμβάκι, Κηπευτικά, Λαχανικά και Φυτώρια.

**Με το νερό του ποτίσματος**

**1. Κηπευτικά - Λαχανικά:** 3 εφαρμογές με 150-250 γρ. ανά στρέμμα, ανά εφαρμογή. α. Μετά τη μεταφύτευση (ευνοεί την ανάπτυξη των ριζών), β. Κατά τη διάρκεια της αρχικής ανάπτυξης, γ. Κατά την ανάπτυξη των καρπών

**2. Εσπεριδοειδή:** 2-3 εφαρμογές με 150-250 γρ. ανά στρέμμα, ανά εφαρμογή αναλόγως των ποικιλιών. α. Κατά Φεβρουάριο - Μάρτιο, β. Κατά Ιούλιο - Αύγουστο, γ. Οκτώβριο (σε όψιμες ποικιλίες).

**3. Οπωροφόρα - Αμπέλι:** 3 εφαρμογές με 150-250 γρ. ανά στρέμμα, ανά εφαρμογή. α. Κατά την άνθηση, β. Κατά το αραίωμα, γ. Κατά την ανάπτυξη των καρπών.

**4. Καλαμπόκι - Βαμβάκι:** 200 - 600γρ. ανά στρέμμα σε 2 εφαρμογές. α. Προ του φυτρώματος, β. Προ της άνθησης

**Με την άρδευση με σταγόνες:** Για καλύτερα αποτελέσματα η συνολική δόση των 500 - 1000 γρ. ανά στρέμμα να μοιραστεί σε εφαρμογές ανά 10ήμερο καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών.

**Μοσχεύματα - Φυτά με ρίζες:** Εμβάπτιση σε ένα διάλυμα 100-175 γρ. ανά 100 λίτρα νερό ή ενσωματώστε 0,5-1γρ. ανά τετραγωνικό μέτρο υποστρώματος

**Με διαφυλλικά λιπάσματα:** 50-75γρ. ανά 100 λίτρα νερό με τη δόση του λιπάσματος

**Με Χημικά Ιχνοστοιχεία:** 150-200γρ. ανά 100 λίτρα νερό μαζί με τη δόση του ιχνοστοιχείου.

**Εξαιρετική ανοχή σε άλατα:** Ανώτερη συνδυαστικότητα με όλους τους τύπους λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Το προϊόν έχει pH 8-10 (διάλυμα 3%) ενώ είναι πλήρως υδατοδιαλυτό σε pH από 2-12. Δεν κατακρημνίζεται από το διάλυμα όπως τα συμβατικά χουμικά προϊόντα. Αποτελεσματικό συμπλήρωμα σε μία μεγάλη κλίμακα Ν.Ρ.Κ., ιχνοστοιχείων, δευτερευόντων θρεπτικών υλικών ή συνδυασμών λιπασμάτων