



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και την εφαρμογή. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά τον χειρισμό και καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή να φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.** Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. **Διάθεση του περιεχομένου/ περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ΜΗ ρυπαίνετε τη νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.**

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Ποτέ μη δίνετε νερό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε αναπνευστική θέση. Παρέχετε επαρκή παροχή αερισμού. Συμβουλευτείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Μην χρησιμοποιείτε παραγόντες εξουδετέρωσης. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777**

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες, ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογίνεας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Για βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων, προτείνεται να πραγματοποιείται η εφαρμογή όταν η ατμοσφαιρική υγρασία είναι υψηλή και οι συνθήκες εννοούν το αργό στεγνώμα (γιατίς το πρώιμ αργά το απόγευμα). Μην αφήνετε το ψεκαστικό υγρό στον ψεκαστήρα για περισσότερο από 24 ώρες. Ανεπαρκής κάλυψη μπορεί να μειώσει το χρωματισμό ή να περιορίσει την ομοιομορφή κατανομή του χρώματος στους βότρες. Μειώστε τη δόση στα 0,2 λίτρα/100λιτρο όταν η θερμοκρασία αναμένεται να υπερβεί τους 30°C για αρκετές μέρες μετά την εφαρμογή. Η χρήση για αραίωμα έχει δοκιμαστεί εκτενώς στην ποικιλία 'Italia'. Πριν τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε

ProTone™ SL
Φυτορυθμιστής ανάπτυξης
Πυκνό διάλυμα (SL)

Valent BioSciences

Φυτορρυθμιστής ανάπτυξης που περιέχει S-abcisic acid, φυτορμόνη που υπάρχει στα φυτά. Το προϊόν ενισχύει και βελτιώνει το χρωματισμό των κόκκινων ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών. Επίσης χρησιμοποιείται για το αραίωμα των βότρων στα επιτραπέζια σταφύλια.

ΑΑΔΑ: 8255/ 9.8.2016
Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: S-abcisic acid (S-αμψισικό οξύ) 10.4% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: ως 100% β/β

Περιεχόμενο: **2 Λίτρα**



SUMITOMO CHEMICAL

Κάτοχος της γκρουντ:
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or - Γαλλία
Tel: +33 (0)4 78 64 33 20

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΧΕΛΛΟΦΑΡΜ Α.Ε.
1^η χλμ Α. Παϊναίος Μαρκοπούλου,
ΤΘ 100, 19002, Παλαιά.
Τηλ: 210 6800900
E-mail: info@helafarm.gr

Παρασκευαστής:
Valent BioSciences LLC
1910 Innovation Way, Suite 100
Libertyville, IL 60048 U.S.A.
1-800-523-9597

™ Εμπορικό όνομα της Valent BioSciences LLC, USA
List No. 05723-49-01 04-9995/84

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

άλλη ποικιλία, συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο διάθεσης.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό και δροσερό μακριά από παγετό και πηγές θερμότητας. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 3 χρόνια.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες κόκκινου χρώματος): Για τη βελτίωση και την ομοιομορφή της κατανομής του χρώματος των καρπών. Ψεκασμός κατευθυνόμενος στη ζώνη των βότρων με την έναρξη ωρίμανσης (αλλαγή χρώματος των ραγών). Εξασφαλίστε πλήρη κάλυψη όλων των βότρων από όλες τις πλευρές των πρέμων αποφεύγοντας την απορροή. Ανεπαρκής κάλυψη μπορεί να μειώσει το χρωματισμό ή να περιορίσει την ομοιομορφή κατανομή του χρώματος στους βότρες. Αν χρειαστεί, επανάληψη ανά 7 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η ωρίμανση. **Δόση:** 0,4 λίτρα/ στρ. ή 0,4 λίτρα/ 100 L ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/ στρ. **Μέγιστος αριθμός εφ/γν ανά καλ/κή περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημερών.

Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες): Για αραίωμα. Ψεκασμός κατευθυνόμενος στη ζώνη των βότρων στο 80-90% της άνθησης (BBCH 68-69). Εξασφαλίστε πλήρη κάλυψη όλων των βότρων από όλες τις πλευρές των πρέμων αποφεύγοντας την απορροή. Ανεπαρκής κάλυψη μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα. Αν χρειαστεί, επανάληψη σε 3 ημέρες. **Δόση:** 0,24 λίτρα/ στρ. ή 0,4 λίτρα/ 100 L ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60 λίτρα/ στρ. **Μέγιστος αριθμός εφ/γν ανά καλ/κή περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 3 ημερών.

Αρ.Παρτίδας/Lot No:

Ημ.Παραγωγής/ Date of Mfg:

Παρατήρησης: Για το αραίωμα: Το προϊόν προάγει και ενισχύει το αραίωμα στα επιτραπέζια σταφύλια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για να μειώσει το ωμαγές μέγεθος, το εργατικό κόστος αραίωσης και να αυξήσει το μέγεθος των ραγών, το βάρος του βότρου και τη συνολική παραγωγή. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την ποικιλία των σταφυλιών καθώς και τις περιβαλλοντικές και καλλιεργητικές συνθήκες του αμπελώνα.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός κατευθυνόμενος στους βότρες. **Τρόπος παρασκευής του διαλύματος εφαρμογής:** Γεμίστε τον ψεκαστήρα με το μισό απαιτούμενο νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειαστείτε τελείως το βυτίο εφαρμογής και ξεπλύνετε καλά με νερό τρεις φορές καθαρίζοντας καλά και τα ακροφύσια. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά και μη ρυπαίνετε αποστραγγιστικά αλικά ή επιφανειακά νερά με τα υγρά καθαρισμού.

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι: Δεν ορίζεται (καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής). Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Είσοδος αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

8"

4.5"

1.5"

