

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Επιτρέπεται η χρήση του **MONO** σε εδάφη με ουδέτερο ή αλκαλικό PH. Μετά την εφαρμογή του Sitofex® αυξάνονται οι απαιτήσεις του φυτού για να παράγει. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η λίπανση και η άρδευση των φυτών ανάλογα με το φορτίο των φυτών. Το Sitofex® μπορεί να προκαλέσει ελαφρά μεταβολή στο σχήμα των καρπών. Ειδικότερα καλλιέργειες όπου η επικοινωνία είναι ελλιπής, τείνουν να παράγουν καρπούς μικρότερου μήκους και ογκώδεις μετά την εφαρμογή του Sitofex®. Για το λόγο αυτό το Sitofex® θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε καλλιέργειες όπου έχει γίνει καλή επικοινωνία.

Sitofex®

Forchlorfenuron (Φορκλορφενουρόν) 1%

Υγρό γαλακτωματοποίησης (EC)

Εγγ. σύνθεση: forchlorfenuron 1% β/ο
βοηθ.ουσίες 98,8% β/β

Αριθμ. Εγκρίσεως κυκλοφορίας:
8181/30-05-2008

**Φυτορρυθμιστικό σκεύασμα που αυξάνει
το μέγεθος των καρπών του ακτινιδίου και του αμπελιού
(επιτραπέζια ποικιλία σουλτανίνα)**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



Κίνδυνος

Κάτοχος της έγκρισης:
AlzChem Trostberg GmbH
Chemiepark Trostberg
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg, Γερμανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά:



ΑΘΗΝΑ: 1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100,
19002, Παιανία Τηλ.: 210.68.00.900-9

ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380. 22.008-9

Αρ. παρτίδας/Ημ. παρασκευής-
000401 / Ιανουάριος 2020

Ημ. λήξης: Ιανουάριος 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
1000 κ.εκ.

UN-Nr. 1170

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Υποπτο για πρόκληση καρκίνου
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Προφύλαξεις

-Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. -Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. -Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. -Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες/ φλόγες/ θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. -Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. -Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. -Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. -Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφεύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες -Αντίδοτο

-ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. -ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους. -ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. -ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. -Σε περίπτωση αδιαθεσίας από εισπνοή ψεκαστικού υγρού. Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, συμβουλευθείτε γιατρό. -Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό. Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε ποτέ εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777



09-5112010



© AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg (Germany)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΔΟΣΕΙΣ- ΣΤΟΧΟΙ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αμπέλι (επιτραπέζια ποικιλία σουλτανίνα): Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης του φυλλώματος ή κατευθυνόμενοι ψεκασμοί στους βότρες όταν η ράγα έχει διάμετρο 4-6 χιλιοστά με δόση 50-100 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Κατά το χρόνο εφαρμογής του **Sitofex**[®] εφαρμόζεται ο συνήθης ψεκασμός γιββερελλινών. Το **Sitofex**[®] μπορεί να συνδυαστεί με τα συνήθη σκευάσματα γιββερελλινών.

Ακτινίδιο: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης του φυλλώματος ή κατευθυνόμενοι ψεκασμοί στους καρπούς με δόση 50-100 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού, 3 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση.

Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται νωρίτερα από 3 εβδομάδες από την πλήρη άνθηση, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει παραμορφώσεις στην άκρη των ψεκασθέντων καρπών.

Στόχος: αύξηση του βάρους και του μεγέθους των καρπών.

Όγκος ψεκαστικού υγρού:

Για ψεκασμούς κάλυψης φυλλώματος: 100 λίτρα /στρ.

Για κατευθυνόμενους ψεκασμούς στους καρπούς: 50 λίτρα /στρ.

Μέγιστος αριθμός ψεκασμών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Τρόπος δράσης: Το δρων συστατικό του σκευάσματος forchlorfenuron (CPPU), είναι παράγωγο της φαινυλουρίας και έχει δράση παρόμοια της κυτοκίνης. Όπως και οι φυσικές κυτοκίνες το forchlorfenuron προάγει τη διαίρεση και την αύξηση των κυττάρων των φυτικών ιστών. Δεν μετακινείται μέσα στα φυτά, ούτε μεταφέρεται από τα ψεκασμένα φύλλα στους καρπούς και από τον έναν καρπό στον άλλον.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύντε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Φυτοτοξικότητα: Το σκευάσμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις εγκεκριμένες χρήσεις, εφόσον πληρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: δεν ορίζεται (καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής)

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος :

Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές θερμότητας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Επιτρέπεται η χρήση του **MONO** σε εδάφη με ουδέτερο ή αλκαλικό PH. Μετά την εφαρμογή του Sitofex® αυξάνονται οι απαιτήσεις του φυτού για να παράγει. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η λίπανση και η άρδευση των φυτών ανάλογα με το φορτίο των φυτών. Το Sitofex® μπορεί να προκαλέσει ελαφρά μεταβολή στο σχήμα των καρπών. Ειδικότερα καλλιέργειες όπου η επικοινωνία είναι ελλιπής, τείνουν να παράγουν καρπούς μικρότερου μήκους και ογκώδεις μετά την εφαρμογή του Sitofex®. Για το λόγο αυτό το Sitofex® θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε καλλιέργειες όπου έχει γίνει καλή επικοινωνία.

Sitofex®

Forchlorfenuron (Φορκλορφενουρόν) 1%

Υγρό γαλακτωματοποίησιμο (EC)

Εγγ. σύνθεση: forchlorfenuron 1% β/ο
βοηθ.ουσίες 98,8% β/β

Αριθμ. Εγκρίσεως κυκλοφορίας:
8181/30-05-2008

**Φυτορρυθμιστικό σκεύασμα που αυξάνει
το μέγεθος των καρπών του ακτινιδίου και του αμπελιού
(επιτραπέζια ποικιλία σουλτανίνα)**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



Κίνδυνος

Αρ. παρτίδας/Ημ. παρασκευής-
000401 / Ιανουάριος 2020

Ημ. λήξης: Ιανουάριος 2022

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ:
1000 κ.εκ.

UN-Nr. 1170

Κάτοχος της έγκρισης:
AlzChem Trostberg GmbH
Chemiepark Trostberg
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg, Γερμανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά:



ΑΘΗΝΑ: 1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100,
19002, Παιανία Τηλ.: 210.68.00.900-9

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380. 22.008-9

Υγρό και ατμό εύφλεκτα.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Υποπτο για πρόκληση καρκίνου
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Προφύλαξεις

-Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. -Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. -Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. -Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες/ φλόγες/ θερμές επιφάνειες. -Μην καπνίζετε. -Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. -Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. -Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. -Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφεύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες -Αντίδοτο

-ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. -ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους. -ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. -ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. -Σε περίπτωση αδιαθεσίας από εισπνοή ψεκαστικού υγρού. Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, συμβουλευθείτε γιατρό. -Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό. Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε ποτέ εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

