

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ - Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος. Κρατήστε μακριά τα κατοικίδια. Μην το τοποθετείτε σε σωρούς. Σκουπίστε και μαζέψτε αμέσως όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση των κενών μέσων συσκευασίας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες -Αντίδοτο. Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο. ΜΗ χορηγήσετε τίποτα από το στόμα εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό και δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή και κρατήστε τον ζεστό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

Αριθμ. Πρωτίδας - Ημερ. Παρασκευής - Ημ. Λήξης: Βλέπε επί τη συσκευασία



GB (Κοκκώδες δόλωμα)

Εγγ. Σύνθεση: Metaldehyde 4% β/β ,
Βοηθ. Ουσίες 95,94 % β/β
Περιέχει πικραντικό παράγοντα

ΑΑΔΑ: 5025/12-05-2016

Κοχλιολειμακοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιγάκων. Δρα από στομάχου.

Μετά από τη λήψη του δολώματος και την αρχική υπερέκκριση βλέννας τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσαλιγάκες χάνουν την κινητική τους ικανότητα, παραλύουν και πεθαίνουν



ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ.
Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.

Κάτοχος της άδειας :
DE SANGOSSE SA, Bonnel
BP 5, F47480 Pont-du-Casse,
Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



Τ'χλμ. Α. Παιανίας Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100,
19002, Παιανία, Τηλ.: 210.68.00.900,
info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

**Καθαρό βάρος:
500 γραμμάρια**

Φάσμα δράσης: Κοχλιολειμακοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών (Κοχλίες) και γυμνοσαλιγάκων (Λειμακες Αρίονες) με δόση α) Καθολική εφαρμογή 500 γρ./ στρ (μέγιστο), β) Πάνω στη γραμμή 500 γρ./ στρ (μέγιστο), γ) Σε ανάμιξη με τον σπόρο 400 γρ./ στρ (μέγιστο), δ) Στο αυλάκι σποράς 400 γρ./ στρ (μέγιστο). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών: 4 (ανά 5 ημέρες)

Πεδίο εφαρμογής: Αμπέλια, εσπεριδοειδή, ακρόδρουα, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, μικροί καρποί, Φράουλα (υπαίθρου): Καθολική εφαρμογή ή πάνω στη γραμμή φυτείας. Έως τέλος άνθησης/ BBCH69. **Πατάτα (υπαίθρου):** Καθολική εφαρμογή. Έως 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή/ BBCH97. **Λαχανικά (κραμβοειδή, φυλλώδη), Εδώδιμα αρωματικά φυτά (υπαίθρου):** Καθολική εφαρμογή. Έως την έναρξη έκπτυξης των πλευρικών ματιών, του σχηματισμού κεφαλής ή ροζέτας/ BBCH40.

Αγκινάρα (υπαίθρου): Καθολική εφαρμογή. Έως την εμφάνιση της κεφαλής /BBCH39. **Νωπά ψυχανθή και όσπρια(υπαίθρου):** Καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 5 φύλλων /BBCH15. **Ζαχαρότευτλα, κτηνοτροφικά τεύτλα και άλλα ριζωματώδη κηπευτικά, Αραβόσποτος, Γλυκοκαλάμποκο, Σόργο, Κεχρί (υπαίθρου):** Στο αυλάκι σποράς ή καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 5 φύλλων /BBCH15. **Ελαιούχοι σπόροι (εκτός από αραχίδα) (υπαίθρου):** Στο αυλάκι σποράς ή καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 7 φύλλων /BBCH17. **Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, τριτικάλε) (υπαίθρου):** Σε ανάμιξη με τον σπόρο ή καθολική εφαρμογή. Έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους / BBCH30. **Νέοι λειμώνες (σίκαλη) (υπαίθρου):** Καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 5 φύλλων /BBCH15.

Καλλωπιστικά φυτά και για δρεπτά άνθη, Χλοοτάπητες (υπαίθρου): Καθολική εφαρμογή σε όλα τα στάδια . **Φράουλα (θερμοκηπίου):** Καθολική εφαρμογή ή πάνω στη γραμμή φυτείας. Έως τέλος άνθησης/ BBCH69. **Μαρούλι και άλλα φυλλώδη λαχανικά, Αρωματικά φυτά (θερμοκηπίου):** Καθολική εφαρμογή. Έως την έναρξη έκπτυξης πλευρικών ματιών, ή τον σχηματισμό κεφαλής ή ροζέτας /BBCH40. **Καλλωπιστικά φυτά και για δρεπτά άνθη (θερμοκηπίου):** Καθολική εφαρμογή σε όλα τα στάδια. **Τρόπος εφαρμογής:** Σκορπίζεται α) ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του εδάφους ή της καλλιέργειας(καθολική εφαρμογή), β) τοπικά πάνω στη γραμμή φυτών, γ) τοπικά μέσα στο αυλάκι κατά τη σπορά ή το φύτεμα δ) σε ανάμιξη με τον σπόρο. Εφαρμόζεται κυρίως με μηχανοκίνητο διανομέα κοκκωδών σκευασμάτων με περιστρεφόμενους φυγόκεντρους δίσκους. Επιτρέπεται η εφαρμογή του και με το χέρι ιδιαίτερα σε μικρή έκταση εφαρμογής, σε καλλιέργειες θερμοκηπίου και/ή πάνω στη γραμμή. Να φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο ή τρύπηση για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτιθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή. Να εφαρμόζεται με υγρό καιρό όταν τα σαλιγκάρια είναι περισσότερο δραστήρια. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής σε νέους λειμώνες (από σίκαλη) για τουλάχιστο 49 ημέρες (δηλ. 7 εβδομάδες) από την τελευταία εφαρμογή. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Εσπεριδοειδή, Ακρόδρουα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλια, Μικροί καρποί, Φράουλες: BBCH 69 (τέλος άνθησης), Ζαχαρότευτλα κ.α. κτηνοτροφικά τεύτλα και ριζωματώδη κηπευτικά, Αραβόσποτος, Γλυκοκαλάμποκο, Σόργο, Κεχρί, Νωπά ψυχανθή και Όσπρια: BBCH 15 (5 φύλλα), Λαχανικά (κραμβοειδή, μαρούλι κ.α.φυλλώδη), εδώδιμα αρωματικά: BBCH 40 (έναρξη σχηματισμού κεφαλής ή ροζέτας ή έκπτυξης πλευρικών ματιών), Αγκινάρα: BBCH 39 (εμφάνιση της κεφαλής), Ελαιούχοι σπόροι (εκτός από αραχίδα): BBCH 17 (7 φύλλα), Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, τριτικάλε): BBCH 30 (έναρξη επιμήκυνσης στελέχους), Πατάτα: 7 ημέρες, Νέοι λειμώνες (σίκαλη): (5 φύλλα) **49 ημέρες πριν την επιστροφή των παραγωγικών ζώων ή πριν την κοπή των φυτών για βόσκηση.** **Παρατηρήσεις: 1) Η συνιστώμενη μέγιστη συνολική δόση είναι 1,75 κιλό προϊόντος ανά στρέμμα, ανά καλλιέργεια και ανά έτος και ο μέγιστος συνιστώμενος αριθμός εφαρμογών είναι 4 ανά καλλιεργητική περίοδο.**

2) Εφαρμόζεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσαλιγάκες είναι σε έντονη δραστηριότητα, προληπτικά ή με τις πρώτες ζιμιές στα φυτά. 3) Για την παρακολούθηση της προσβολής και την έγκαιρη εκτίμηση του κινδύνου προσβολής συνιστάται η χρήση ειδικών παγίδων. 4) Για καταπολέμηση των γυμνοσαλιγάκων να εφαρμόζεται πριν αναρριχηθούν στην κόμη του φυτού. 5) Εάν εφαρμόζεται με ανάμιξη με τον σπόρο η ανάμιξη αυτή πρέπει να γίνεται σχολαστικά πριν και κατά την εφαρμογή. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά αεριζόμενο, ξηρό, δροσερό και θερμοκρασία περιβάλλοντος <35°