

Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία:

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Φοράτε κατάλληλα γάντια.

Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Πρώτες βοήθειες:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανιστεί ερεθισμός.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή την ετικέτα.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων :
2107793777

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Να αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος, σε θερμοκρασία μεταξύ 0° και 35°C. Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 5 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αρ:

Παρ.:

CARELYN L

Σύνθεση (β/β): Φώσφορος (P₂O₅) υδατοδιαλυτός 21%
Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός 0.03%

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Υγρό λίπασμα με κύρια θρεπτικά (P₂O₅) και ιχνοστοιχεία (Fe) για διαφυλλικό ψεκασμό ή υδρολίπανση

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**βιολογική
γεωργία**

**Περιεχόμενο:
1 ΛΙΤΡΟ (~1,2kg)**

Xn



Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Παρασκευαστής: **AISA**

Aditivos Inteligentes S.A.
C/Del Gremis No 22 poligono Ind. L/
Alter 46290, Valencia, Ισπανία
Αντιπρόσωπος, διανομέας για την Ελλάδα:



ΑΘΗΝΑ:- ΣΥΓΓΙΔΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ.: 210.68.00.900-9, 2310.797.907
e-mail: info@hellafarm.gr

ΣΤΟΧΟΙ-ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Το CARELYN L είναι υγρό λίπασμα φωσφόρου και σιδήρου που απορροφάται ταχύτατα από τα φυτά. Η ταυτόχρονη απορρόφηση των δύο στοιχείων αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους και εξασφαλίζει υγιή και εύρωστα φυτά. Παράλληλα έχει διαπιστωθεί ότι έχει απωθητική δράση στα σαλγκάρια και τους γυμνοσάλιαγκες.

Συνιστάται για πολυετείς και ετήσιες καλλιέργειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογές με ψεκασμό φυλλώματος ή με υδρολίπανση (μαζί με το νερό άρδευσης).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- ψεκασμός: 300-500 κ.εκ./ στρέμμα
- υδρολίπανση (μέσω άρδευσης): 500 κ.εκ./ στρέμμα

Τρόπος παρασκευής του διαλύματος: Γεμίστε το δοχείο του μέσου εφαρμογής με το μισό απαιτούμενο νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του λιπάσματος στο δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα.

pH προϊόντος: όξινο

Γενική σύσταση: προτείνεται να εφαρμόζεται με συμβουλή γεωπόνου. Σε περιπτώσεις υποψίας κινδύνου φυτοτοξικότητας να προηγείται δοκιμή μικρής έκτασης.