

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 - Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
 - Αποφύγετε επαφή με τα μάτια .
 - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 - Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί.
 - Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
 - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ**
- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
- Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210.77.93.777**

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του (να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από απ'ευθείας έκθεση στον ήλιο παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αρ. Παρτίδας, Ημ. Παραγωγής-Ημ.Λήξης:βλέπε επί της συσκευασίας

HELLAFIX 1SL

1-naphthyl acetic acid (1 ναφθιλασέτικ άσιντ) 1% Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: 1-naphthyl acetic acid 1 % β/ο
βοηθ. ουσίες 98.99 % β/β

Αριθμός έγκρ. κυκλ.:
8135/12.9.02

ΑΝΤΙΚΑΡΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΣΕ ΜΗΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΙΕΣ. ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΟ ΜΙΣΧΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΠΟΠΤΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**Περιεχόμενο:
1 ΛΙΤΡΟ**



Κάτοχος της άδειας:
Amvac Chemical UK Limited,
Surrey Technology Centre,
40 Occam Road,
The Surrey, Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YG, UK

Υπεύθυνος επικοινωνίας-
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ

Μηλοειδή (Μηλιά-Αχλαδιά): Αντικαρποπτωτική ορμόνη για ενδυνάμωση του μίσχου και περιορίζει την καρπόπτωση πριν την ωρίμανση των καρπών.

Δόση: 100κ.εκ. / 100 λίτρα νερό.

Ψεκάζεται 7-10 ημέρες πριν τη συνηθισμένη πτώση των καρπών. Η δράση του αρχίζει μια εβδομάδα από την ημέρα ψεκασμού και διαρκεί 2-3 εβδομάδες. Αν θέλουμε να κρατηθούν τα φρούτα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα δένδρα μπορεί να γίνει και δεύτερος ψεκασμός μετά από 3 εβδομάδες και με την ίδια αναλογία.

Όγκος ψεκ.υγρού (Λίτρα/στρέμμα):20 - 80.

Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 21 ημέρες

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος της κόμης των δέντρων.
2. Απαιτείται καλό λούσιμο των καρπών και ιδιαίτερα των ποδίσκων τους.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται με ζεστό και ξηρό καιρό .

Τρόπος εφαρμογής :Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες μεγάλου όγκου με καλό λούσιμο των φυτών.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζετε το ψεκαστικό με το 1/3 του απαιτούμενου νερού και προσθέτετε το σκεύασμα. Υπό συνεχή ανάδευση προστίθεται το υπόλοιπο νερό.

Φυτοτοξικότητα : Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή : Μη εφαρμόσιμο

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.