

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** -Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά -Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. -Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης. -Να φοράτε προστατευτικά γάντια προστατευτικά ενδύματα/μάσκα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. -Φοράτε κατάλληλες μπότες.

-Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

-Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

-Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο**  
Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πνιγμού/πνιγμού έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε

γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε το ρομπότρωμα με το ψεκαστικό υγρό ρουχά αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει, γίνεστε απειρή συμβουλευθείτε

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: (016) 7783777

**ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

  
**ENHANCE®**  
85 SG  
**DAMINOZIDE**  
**(NTAMINOZANT) 85%**

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ: 8195 / 31-01-2011

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (SG)

**Εγγυημένη σύνθεση:**  
daminozide 85% β/β (ομάδα: υδραζιδια)  
Βοηθ. ουσίες: 13,4 % β/β

**Φυτορρυθμιστική ουσία για χρήση σε χρυσάνθεμο, ηλιάνθο, σπίνη, σταυρανθή, κόσομο, Dicenta, λομπέλια, νεμέζια, ρήλοχ, αόλβια, κατφέ, βιόλα, ζίνια, καλανχόη, ορτανσία, πετούνια, αζαλέα.**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**fine**

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:  
**FINE AGRICHO-CHEMICALS LTD,**  
Hill End House, Whittington,  
Worcester, WR5 2RO  
Ηνωμένο Βασίλειο



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Υποψη για πρόκληση καρκίνου



1<sup>ο</sup> χλμ. Α. Παιονίας Μαρκοπούλου ΤΘ 100,  
19002 Παιονία.  
Τηλ: 2106800900, email: info@hellafarm.gr

**Καθαρό βάρος: 1 κιλό**

® To Dazide Enhance είναι εγκεκριμένο εμπορικό σήμα της Fine Holdings Ltd.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκόμιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτούργειας ή περιβαλλοντολογικές** υπό τις οποίες το σκέυοςμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκελευστεί:

-Να μην εφαρμόζεται το DAZIDE ENHANCE 85 SG εντός διαστήματος 7 ημερών (πριν ή μετά) από την εφαρμογή χαλκούχου σκευάσματος (πιθανότητα εγκαυμάτων στα φύλλα). - Το φύλλωμα των ψεκασμένων φυτών δεν πρέπει να βραχεί με νερό για τουλάχιστον 48 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος. - Συνιστάται να μην εφαρμόζεται σε φυτά αδύνατα που υποφέρουν από τροφοπνίες, από έλλειψη νερού, ζημίες παγετού ή ηλιακό κάψο. - Να εφαρμόζεται κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας σε καλά ποτισμένα αλλά στεγνά φυτά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Αρ. Παρτίδας-Ημ. Παρασκευής : βλέπε επί της συσκευασίας

DAE/GR/1/23

Productname	Dazide Enhance		
Country	Greece		
Package size	1 Kg		
Label code	DAE/GR/1/23		
Label dimensions	100x110 (hwxw)	Name	Marco Pelkman
Label date	oktober 19, 2023 9:28 a.m.	Draft	Version 3



## Dazide Enhance 85 SG

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

#### **Χρυσάνθεμο:**

Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων. Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων σε:

#### **α) Φυτά σε γλάστρες:**

Εφαρμογή με 2,5 - 5 γρ./ λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 1000 γρ./ στρέμμα) όταν η νέα βλάστηση αποκτήσει μήκος 2 εκατοστών. Η δόση εξαρτάται από την ποικιλία και την ταχύτητα ανάπτυξης. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 100 - 200. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών εφόσον απαιτείται.

#### **β) Φυτά κοπής μονών δρεπών ανθέων (Standard Χρυσάνθεμα):**

Ακολουθήστε πρόγραμμα 1 - 3 εφαρμογών ανάλογα με την ταχύτητα ανάπτυξης και την ευρωστία της καλλιέργειας με δόση εφαρμογής 2 - 4 γρ./ λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 600 γρ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 100 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών εφόσον απαιτείται. Ή εναλλακτικά για ποικιλίες ταχείας ανάπτυξης (π.χ. euro) ακολουθήστε πρόγραμμα 2 εφαρμογών με δόση εφαρμογής 5 γρ./ λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 750 γρ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 100 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών εφόσον απαιτείται.

#### **γ) Για τις ποικιλίες Shoemith & Rivalry sports:**

0,6 γρ./ λίτρο και 1,0 γρ./ λίτρο. (μέγιστο 135 γρ./ στρέμμα) κατά την 7η και 14η μέρα αντίστοιχα μετά την έναρξη πρόκλησης παραγωγής ανθέων. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 100 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 3 εφόσον απαιτείται.

#### **Ηλιάνθος (σε γλάστρες ή θερμοκήπιο):** Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων.

Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων. Εφαρμογή με 4 γρ./ λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 600 γρ./ στρέμμα) ο χρόνος και ο αριθμός των εφαρμογών εξαρτώνται από την ποικιλία και την ταχύτητα αύξησης και ανάπτυξης των φυτών. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.

**Καλλωπιστικά σε γλάστρες (αστήρ, σταυρανήθ, κόσμος, Dicenta, λουπέλια, νεμέζια, ρίλιχ, σάλβια, κατηφές, βιόλα και ζίνια περιλαμβανομένων):** Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων. Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων. Δόση εφαρμογής 1,5 - 6 γρ./ λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 900 γρ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 5 με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 7 ημερών εφόσον απαιτείται. Η δόση, ο χρόνος και ο αριθμός εφαρμογών που

απαιτείται για ικανοποιητική επίδραση στην ανάπτυξη εξαρτώνται από το είδος και την ποικιλία καθώς και από την ταχύτητα αύξησης και ανάπτυξης του φυτού. Γι' αυτό και συνιστάται να προηγηθούν δοκιμές μικρής έκτασης πριν την ευρεία χρήση. Το εύρος της δόσης σχετίζεται με την ποικιλία και τις συνθήκες ανάπτυξης. Οι μεγαλύτερες δόσεις απαιτούνται σε συνθήκες που προκαλούν ταχεία ανάπτυξη και σε ταχέως αναπτυσσόμενες ποικιλίες και οι μικρότερες σε συνθήκες αργής ανάπτυξης (π.χ. χαμηλού φωτισμού) και σε ποικιλίες αργής ανάπτυξης. Για τα καλλωπιστικά σε γλάστρες δόσεις μεταξύ 1,5 και 3,5 γρ./λίτρο είναι επαρκείς για τις περισσότερες περιπτώσεις. Η δόση εφόσον απαιτείται μπορεί να αυξηθεί έως τα 6 γρ./λίτρο ανάλογα με το είδος, την ποικιλία και τις συνθήκες ανάπτυξης.

**Καλιανόχη:** Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων. Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων. Εφαρμογή με 1-3 γρ./λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 450 γρ./ στρέμμα) όταν τα φυτά αναπτύσσουν νέα βλάστηση (περίπου 2 εκ). Όλες οι εφαρμογές πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν οι ανθοφόροι οφθαλμοί γίνουν σαφώς ορατοί. Οι εφαρμογές μπορεί να προκαλέσουν καθυστέρηση της άνθησης. Σε ευαίσθητες ποικιλίες και υπό ορισμένες συνθήκες (χαμηλός φωτισμός και/ή χαμηλή θερμοκρασία) μπορεί να παρουσιαστούν ελαφρά συμπτώματα φυτοτοξικότητας στο φύλλωμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 80 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 7 ημερών. Ο αριθμός των εφαρμογών και το μεσοδιάστημα εξαρτώνται από την εποχή και την ποικιλία.

**Ορτανσία:** Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων. Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων. Έναρξη εφαρμογών όταν τα φυτά αναπτύσσουν νέα βλάστηση. Η 1η εφαρμογή όταν η νέα βλάστηση έχει μήκος 1-2 εκ και πάντως όχι αργότερα από 4 βδομάδες μετά την έναρξη του φορτσαρίσματος. Δόση εφαρμογής 4 γρ./λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 600 γρ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 9-10 ημερών εφόσον απαιτείται.

**Πειτούνια:** Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων. Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων. Δόση εφαρμογής 4 - 6 γρ./λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 900 γρ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50 - 150. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 5 με μεσοδιάστημα 4 - 5 ημέρες εφόσον απαιτείται. Η δόση, ο αριθμός και ο χρόνος των εφαρμογών ποικίλλει ανάλογα με την ποικιλία και το ρυθμό ανάπτυξης.

**Αζαλέα σε γλάστρες:** Μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων και δημιουργία πιο σκουροχρωμών φύλλων. Ένας ψεκασμός όταν η νέα βλάστηση είναι 2,5-5 εκ. Δόση εφαρμογής 2,5 γρ./λίτρο ψεκ. υγρού (μέγιστο 250 γρ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50 - 100. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 1.

#### **Παρατηρήσεις:**

1. Η αναπόκριση των φυτών στο προϊόν μπορεί να ποικίλει σημαντικά ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, το στάδιο ανάπτυξης και πραγματικές καλλιεργητικές συνθήκες (θερμοκρασία, ένταση φωτός κλπ). Συνιστάται στους παραγωγούς καλλωπιστικών φυτών να δοκιμάζουν το προϊόν υπό τις δικές τους τοπικές

συνθήκες και τις ποικιλίες που καλλιεργούν σε μικρές πλοτικές εφαρμογές πριν προχωρήσουν σε εφαρμογές μεγάλης έκτασης.  
2. Η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε θερμοκήπια

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί αμέσως.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις προτεινόμενες καλλιέργειες εφόσον πληρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. Ωστόσο η αντίδραση των φυτών εξαρτάται από την ποικιλία, το στάδιο και το ρυθμό ανάπτυξης και υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να παρατηρηθεί καθυστέρηση της άνθησης ή παραγωγή ανθών με πιο ωχρό χρωματισμό. Να μην εφαρμόζεται στην ποικιλία χρυσάνθεμου Fandangó.

**Συνδυαστικότητα: ---**

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Μη εφαρμοσίμο (προορίζεται μόνο για καλλωπιστικά φυτά).

**Τρόπος δράσης:** Φυτορρυθμιστική ουσία για μείωση των μεσογονατίων διαστημάτων. Παραγωγή πιο συμπαγών φυτών. Δημιουργία πιο δυνατών μίσχων και πιο σκουροπράσινων φύλλων. Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας – μειώνοντας τα επίπεδα των γιβερυλλινών στο φυτό με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της αύξησης των φυτών<sup>1</sup>

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.<sup>2</sup>

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** -Φυλάσσετε κλειδωμένα μακριά από παιδιά -Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. -Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης. -Να φοράτε προστατευτικά γάντια προστατευτικά ενδύσματα, ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. «Φοράτε κατάλληλες μπότες».

«Σε περίπτωση επανεπίθεσης στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε προστατευτική ενδυμασία και γάντια.»  
Διάθεση περιεχομένου/περιεκτι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο**  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πνιγμού/εξέθεσης Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε

γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα όργανα: Αφαιρέστε το εμπερισταμένο με το ψεκαστικό υγρό ρουχό και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο εφροδός παραμένει, ύστερα απευθύνεστε στον γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Εκπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**ΑΝΤΙΛΟΓΟ:** Δεν υπάρχει ειδική αντίδοτο. Εφοδιάστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

**ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

 **dazide**  
**ENHANCE®**  
85 SG

**DAMINOZIDE  
(NTAMINOZAIT) 85%**

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 8195 / 31-01-2011

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (SG)

**Εγγυημένη σύνθεση:**

daminozide 85% β/β (ομάδα: υδραζιδία)  
Βοηθ. ουσίες: 13,4 % β/β

**Φυτορρυθμιστική ουσία για χρήση σε χρυσάνθεμο, ηλιάνθο, ασπιρ, σταυρανθή, κόσο, Dicenta, λομπέλια, νεμέζια, ρηλοχ, σάλβια, κατφέ, βιόλα, ζίνια, καλανχόη, ορτανσία, πετούνια, αζαλέα.**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**fine**

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: FINE AGROCHEMICALS LTD, Hill End House, Whittington, Worcester, WR5 2RO, Ηνωμένο Βασίλειο

 **ΕΛΛΗΣΠΡΩΤΗ**

1\* Υ.μ. Α. Παιανίας Μαρκοπούλου ΤΘ 100, 19002 Παιανία, Τηλ: 2106800900, email: info@hellafarm.gr



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Υποπό για πρόκληση καρκίνου

**Καθαρό βάρος: 1 κιλό**

© Το Dazide Enhance είναι εγκεκριμένο εμπορικό σήμα της Fine Holdings Ltd.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκόμινο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτιθέτουμε σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές** υπό τις οποίες το σκέυασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: -Να μην εφαρμόζεται το DAZIDE ENHANCE 85 SG εντός διαστήματος 7 ημερών (πριν ή μετά) από την εφαρμογή γαλκούχου σκευάσματος (πιθανότητα εγκαύματος στα φύλλα). - Το φύλλωμα των ψεκασμένων φυτών δεν πρέπει να βραχεί με νερό για τουλάχιστον 48 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος. - Συνιστάται να μην εφαρμόζεται σε φυτά αδύνατα, που υποφέρουν από τροφοπενία, από έλλειψη νερού, ζιμής παγετού ή νηματώδεις. - Να εφαρμόζεται κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας σε καλά ποτισμένα αλλά στεγνά φυτά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Αρ. Παρτίδας-Ημ. Παρασκευής : βλέπε επί της συσκευασίας

DAE/GR/1/23



Dazide Enhance GR 1kg 0923 - Baselabel