

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας (ματιών / προσώπου). • Φοράτε κατάλληλα γάντια και μέσα ατομικής προστασίας ματιών / προσώπου κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή. • Διάθεση περιεχομένου/περιεκτώσιμου με τοπικούς κανονισμούς. • Μην ρυπαίνετε τα νερά με αποβλήτα ή τη συσκευασία του. • Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά: 50% σε Εσπεριδοειδή, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Πράσο, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, 75% σε μηδική και ελαιοκράμβη, 90% σε Αμυγδαλιά, Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα, 95% σε Ελιά, Αμπέλι, Πατάτα, Μαρούλι, Ρόκα, Φύλλα σελίνου, Όσπρια, Καλαμπάκι, Βαμβάκι, Ηλιανθος. • Για να προστατέψετε τα αρθρώσιμα μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη: **10 μέτρα** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95%, σε Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά και Αμπέλι, **5 μέτρα** σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80%, στις υπόλοιπες καλλιέργειες. Σε Ακρόδρυα και Μηλοειδή να μην γίνεται πάλι από ένας (1) ψεκασμός μετά την άνηση. Επικινδύνουν για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων και πάνω. **Για να αποφυγείτε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στομάχι και καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΑΝΤΙΔΟΤΗ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτικό. Ακολουθείτε συστηματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

Αρ. Πορίσθ. Ήμερ. Παρασκευής: Βλέπε άνω μέρος φυλλίου

DELTA MUR GREEN 2.5EC

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη Σύνθεση:
Deltamethrin 2,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 97,22% β/β
Α.Α.Δ.Α : 14712 / 23-08-2019

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



Περιεχόμενο: 1 Λίτρο

Κάτοχος της άδειας-Παρασκευαστής σκευάσματος:
EXCLUSIVAS SARABIA S.A.,
Cami de l'Albí - Ptda. Rec Nou s/n,
25110 Alpicat, Lleida, Spain (Ισπανία).
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



1^η φλ. Α. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002, Παιανία,
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Καλλιέργειες-Στόχος-Δόσεις-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών)

Χρόνος εφαρμογής: εφαρμογές με την εμφάνιση της/των προσβολής/προσβολών BBCH > 10 (εκτός αν αναφέρεται αλλιώς). [Καλλιέργειες: υπαίθρου (Υ)].
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ): για Αφίδες με 30-50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, για Λεκανό & Μύγα της Μεσογείου με 50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτ./στρ. Μία (1) εφαρμογή ανά καλ. περίοδο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών από την αρχή της έκπτυξης των βλαστών μέχρι την αρχή της άνθησης (BBCH 31-32) και από το δέσιμο των καρπών έως ότου οι καρποί να έχουν το 90% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 71-79).
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστίκι, Φουντουκιά, Καρδιά, Καστανιά): για Αφίδες με 50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσουλιά, Λιβάς, Αχλαδομηλιά):** για Αφίδες, Μοτοφάρα, Καρποκόκη, 50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτ./στρ. Μία (1) εφαρμογή ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά):** για Αφίδες με 30-50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, για Μύγα της Μεσογείου με 50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-140 λίτ./στρ. Μία (1) εφαρμογή ανά καλ. περίοδο. **Ελιά:** για Πυρηνότριπη (ανδρῆς και καρπόβια γενιά) με 30-40 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτ./στρ. Εφαρμογή κατά την περίοδο της ανθοφορίας (20% ανθοφορία άνθη) για την ανδρῆς γενιά (BBCH 62) ή μετά την άνηση για την καρπόβια γενιά (BBCH 69-79). Μία (1) εφαρμογή ανά καλ. περίοδο. **Αμπέλι (ονοποποίηση και επιτραπέζια):** για Ευδειίδα με 50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 80-100 λίτ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Φράουλα (Υ):** για Αφίδες με 25-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτ./στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο:** για Κορτοσκούληκα, Θρίπα με 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ):** για Αφίδες, Πράσινο ακοκλήκι, Άλτη, Μαμάστρα, Tutta absoluta, Σποντόπτερα, Αγρότιδα ή Κορτοσκούληκα με 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο:** για Κορτοσκούληκα με 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 λίτ./στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ):** για Αφίδες, Κορτοσκούληκα, Πράσινο ακοκλήκι, Σποντόπτερα με 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Κολοκυθάκι (Υ):** για Αφίδες, Πράσινο ακοκλήκι, Μαμάστρα, Σποντόπτερα με 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Πεπόνι (Υ):** για Αφίδες, Πράσινο ακοκλήκι, Σποντόπτερα, Μαμάστρα, Κορτοσκούληκα με 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Καρπούζι (Υ):** για Αφίδες, Πράσινο ακοκλήκι, Σποντόπτερα, Μαμάστρα με 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Μαρούλι (Υ):** για Πράσινο ακοκλήκι, Σποντόπτερα, Άλτη, Αφίδες, Κορτοσκούληκα με 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Φύλλα σελίνου, Ρόκα:** για Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμάστρα, Άλτη με 35 κ.εκ./στρ., για Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 70 λίτ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Μπιζελιά φρέσκα (αρακάς):** για Αφίδα των μπιζελιών, Στόνα με 25 κ.εκ./στρ., για Αφίδα των κοκκίων, Κάμπια των μπιζελιών, Θρίπα, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτ./στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Σπαράγγι:** για Αφίδες με 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτ./στρ. Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή με την εμφάνιση της προσβολής BBCH > 10. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Όσπρια (Φασόλια, Κουκιά, Φακιά, Ρεβύθια):** για Πράσινο ακοκλήκι, Αφίδες, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτ./στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών και έως την αρχή της άνθησης BBCH 10 - 59. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Ελαιοκράμβη:** για Αφίδες, Κάμπιες Noctuidae με 30 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-60 λίτ./στρ. Μία (1) εφαρμογή ανά καλ. περίοδο, με την εμφάνιση της προσβολής και έως την αρχή της άνθησης BBCH 10 - 59. **Ηλιανθος:** για Αφίδες, Κάμπιες Noctuidae με 30 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-60 λίτ./στρ. Μία (1) εφαρμογή ανά καλ. περίοδο. **Βαμβάκι:** για Ρόβινο & Πράσινο ακοκλήκι με 50-70 κ.εκ./στρ., για Αλευρώδη, Τζιτζικακία με 50 κ.εκ./στρ., για Σποντόπτερα, Αφίδα, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-50 λίτ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Πατάτα:** για Δορυφόρο με 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 λίτ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Αραβόσιτος:** για Πυραλίδα, Σεξάμια, Πράσινο ακοκλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ./στρ., για Διαβρωτικά με 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 60 λίτ./στρ. Μία (1) εφαρμογή ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών. **Σιτάρι, Κριθάρι:** για Αφίδες, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-60 λίτ./στρ. Μία (1) εφαρμογή ανά καλ. περίοδο. **Μηδική:** για Αφίδα & Σκαθάρι των μπιζελιών, Φυτονόμο με 25 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 40 λίτ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Καπνός:** για Θρίπα, Κορτοσκούληκα με 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτ./στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 7 ημερών. **Καλλωπιστικά (Υ):** για Αφίδες, Θρίπες με 25-50 κ.εκ./στρ., για Φυλλοδέτες με 17,5-35 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτ./στρ. Για Αλευρώδη με 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 70 λίτ./στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 7 ημερών.

Παρατηρήσεις: • Στην Ελιά κατά την άνηση, μέγιστη δόση 30 κ.εκ./στρ. • **Στα Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα και Ακρόδρυα, να μην εφαρμόζεται κατά την άνηση.** • Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φ.π. • Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών προετοιμασιών όπου εφαρμόζονται. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** • Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. • Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. • Το σκέυασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το σκέυασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. • Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνουνται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του ψεκαστικού υγρού αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού δοχείου, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:** • μεταξύ εφαρμογής της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκέυασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά (24 ώρες). **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Φράουλα-Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπεριά-Αγγούρι-Αγγουράκι-Κολοκυθάκι-Πεπόνι-Καρπούζι-Μαρούλι-Ρόκα-Αγκινάρα: 3 ημέρες, Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουσουλιά-Αχλαδομηλιά-Λιβάς-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Κερασιά-Δαμασκηλιά-Ελιά-Αμπέλι-Κρεμμύδι-Πράσο-Σκόρδο-Φύλλα Σελίνου-Λάχανο (εκτός από κινεζικό)-Κουνοπιπί-Μπρόκολο-Μπιζελιά-Αρακάς-Πατάτα-Καπνός: 7 ημέρες, Μηδική: 14 ημέρες, Εσπεριδοειδή-Ακρόδρυα-Βαμβάκι-Ζαχαρότευπλα-Αραβόσιτος-Σιτάρι-Κριθάρι: 30 ημέρες, Ηλιανθος: 60 ημέρες, Ελαιοκράμβη-Όσπρια (Φασόλια-Κουκιά-Φακιά-Ρεβύθια): καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής (έως την αρχή της άνθησης), Σπαράγγι: εφαρμογή μετά τη συγκομιδή. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Διατηρείται στο στην αρχική, απαράβατη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.